



ॐ



ఉప వేదాలు

వివాహం-నాంపత్యం

ప్రసవములో ప్రథమ సహాయం



సదాశివ సమారంభం



గురు దక్షిణామూర్తి



గురు వేదవ్యాస మహర్షి



గురు కుంక మహర్షి



గురు నారద మహర్షి



గురు వాల్మీకి మహర్షి



గురు శిక్షు

శంకరాచార్య మధ్యమాం



గురు దత్తాత్రేయ



గురు బాలాజీ



గురు గోతమ బుద్ధ



గురు ఆదిశంకరాచార్య



గురు రామానుజాచార్యులు



గురు జ్ఞానేశ్వర్



గురు రవిదాస్



గురు కబీర్ దాస్



గురు చైతన్య మహా ప్రభువు



గురు నానక్



గురు రాఘవేంద్ర స్వామి



గురు వీరట్రహ్మాండ స్వామి



యోగి నేమన

అస్మదాచార్య పర్యంతం



గురు తైరింగ స్వామి



గురు లాహిరి మహాశయ



గురు రామకృష్ణ పరమహంస, అమ్మ కారదాదేవి



గురు వివేకానంద



గురు సాయి బాబా



గురు అరబింద్



గురు రమణ మహర్షి



గురు యోగానంద



గురు భక్తవేదాంత ప్రభుపాద



గురు మళయాళస్వామి



గురు విద్యాప్రకాశానందగిరి



గురు చంద్రశేఖర పరమాచార్య

వందే గురుపరంపరాం..



నన్ను “నేను” తెలుసుకోవటానికి

నన్ను “నేను” మార్చుకోవటానికి

“నేను” గా ఉండటానికి

మరియు అత్యుత్తమ జీవన విధానానికి

కావలసిన భక్తి,జ్ఞాన,కర్మ,ధర్మ సమాచారం ఒకేచోట తెలుగులో ఉచితంగా!

సాధారణంగా వేదాంతం తెలుసుకోవాలనే కోరిక వుంటుంది, కాని గ్రంథాలు అందుబాటులో లేవు. ఇంకొకరి దగ్గర గ్రంథాలు వుంటాయి, కాని జిజ్ఞాసువులకి ఎక్కడ ఉన్నవో తెలియదు. అలాగే కొన్ని లైబ్రరీ లో కొన్ని రకాల పుస్తకాలు మాత్రమే లభ్యం అవుతున్నాయి.కనుక తమవంతుగా భక్తి,జ్ఞాన ప్రచారార్థం మహానుభావులైన **సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రం** వెబ్ సైట్ వారు ఉచితంగా విలువైన గ్రంథాలను ఆన్ లైన్ ద్వారా eBOOK(PDF) రూపంలో అందిస్తున్నారు.వారు చేస్తున్న జ్ఞాన యజ్ఞానికి సాయి రామ్ కూడా తమవంతుగా సహాయం చేసే కార్యక్రమంలో భాగంగా వారి గ్రంథాలను సాయి రామ్ ద్వారా కూడా అందచేస్తున్నాము, ఇందుకు మేము వారికి కృతజ్ఞత తెలియచేసుకుంటున్నాము. కనుక ప్రతి ఒక్కరు ఈ సదవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోగలరు. ఇందుకు సహాయం చేసిన ఆర్కైవ్ వెబ్ సైట్(<https://archive.org>), గూగుల్ వెబ్ సైట్(<https://www.google.co.in>),మైక్రోసాఫ్ట్ సైట్(<http://www.microsoft.com>) వారికి కూడా మేము ఋణపడివున్నాము. సాయి రామ్ సేవక బృందం కోరుకొనేది ఒక్కటే, ప్రతి ఇల్లు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన గ్రంథాలతో నిండిపోవాలన్నదే మా కోరిక.

ఈ గ్రంథాలను ఉచితంగా ఆన్ లైన్ లో చదువుటకు, దిగుమతి(డౌన్లోడ్) చేసుకొనుటకు గల మార్గాలు:

- 1) **సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రం** వారి వెబ్ సైట్: <http://sundarayya.org/>
- 2) సాయి రామ్ వెబ్ సైట్: <http://www.sairealattitudemanagement.org>
- 3) సాయి రామ్ గూగుల్ సైట్: <https://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement>
- 4) ఆర్కైవ్ వెబ్ సైట్: <https://archive.org/details/SaiRealAttitudeManagement>

ఈ జ్ఞాన యజ్ఞం పై గల సలహాలు,సూచనలకు సేవక బృందాన్ని సంప్రదించుటకు: sairealattitudemgt@gmail.com

సాయి రామ్ భక్తి,జ్ఞాన సమాచారం: <https://www.facebook.com/SaiRealAttitudeManagement>

సాయి రామ్ భక్తి,జ్ఞాన సంబంధ వీడియోలు: <https://www.youtube.com/user/sairealattitudemgt>

ఈ జ్ఞాన యజ్ఞంలో ప్రతి ఒక్కరు పాల్గొని, ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని,మీరు సంతృప్తులైతే మరొక సాధకునికి, జిజ్ఞాసువులకు మార్గం చూపించగలరని ఆశిస్తున్నాము.

గమనిక: భక్తి,జ్ఞాన ప్రచారార్థం ఉచితంగా eBook రూపంలో **సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రం** వెబ్ సైట్ వారు అందించటం జరిగింది. ఈ గ్రంథముపై వ్యాపార,ముద్రణ హక్కులు వారికి గలవు,కనుక వారిని సంప్రదించగలరు.

SaiRealAttitudeManagement(SAI RAM) - సాయి నిజ వ్యక్తిత్వ నిర్వహణ(సాయి రామ్)

*** సర్వం శ్రీ సాయి నాథ పాద సమర్పణమస్తు***

సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రం వారి వెబ్ సైట్:

<http://sundarayya.org/>

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'sundarayya.org'. The website header features the title 'Sundarayya Vignana Kendram' in a large, bold font, with social media icons for Facebook and Twitter to the right. Below the header is a navigation menu with links: Home, About SVK, Library, Projects, Donations, Publications, స్వేచ్ఛా విజ్ఞాన ప్రపంచం, Services, and Contact Us. The main content area is titled 'Sundarayya Centenary Celebrations'. It includes a section titled 'India Today: Looking Back, Looking Forward' with a sub-link 'Watch Videos (Click to Download Papers)'. A paragraph of text follows, and a 'Read More' link is provided. Below this is an 'Agenda' section with a table listing various sessions.

Time	Session	Speakers
4 th May 2013 10:00-14:00	Synoptic Session One Imperialism and the Indian Economy Patterns of Class Formation since Independence Communalisms: Changing Forms and Fortunes Since Independence	Amiya Kumar Bagchi Prabhat Patnaik Aijaz Ahmad
4 th May 2013 15:00-16:30	Industry, Finance, Planning International Finance And Development in India under Neo-Liberalism Capitalists and Industrialisation in India Planning and the regime of Capital in India	C.P.Chandrashekhara Surajit Mazumdar Chirashree Das Gupta
4 th May 2013 17:00-18:30	Women in Economy and Society Economic Policies and Women's Work State Policies and Women The Political Economy of Violence against Women.	Jayati Ghosh Smita Gupta Kalyani Menon Sen
5 th May 2013 9:30-13:30	Synoptic Session Two Agrarian Question and the Post-Independence State Non-Alignment to Dependence: Shifting Paradigms for Foreign Policy State, Market and the Media	Utsa Patnaik Sukumar Muralidharan Sashi Kumar P. Sainath
5 th May 2013 15:00-16:30	The Agrarian Crisis An Overview Assets, Incomes and Employment Credit, Technology and Public Policy in Indian Agriculture	Venkatesh Athreya Vikas Rawal Ramakumar

అతి విశిష్టం ఈ దానం!

“దానాలలోకెల్లా ఆధ్యాత్మిక విద్యాదానం చాలా శ్రేష్ఠమైంది! దాని తరువాతిది లౌకిక జ్ఞానదానం, ప్రాణదానం, అన్నదానం” అని వ్యాసమహర్షి చెప్పారు.

మన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం భారతదేశ హద్దులలో నిలిచి పోకూడదు. లోకమంతటినీ ఆవరించాలి! ఇలా లోకవ్యాప్తమైన ధర్మప్రచారాన్ని మన పూర్వులు చేశారు. హైందవ వేదాంతం ఎన్నడూ ఈ దేశం దాటి పోలేదని చెప్పేవారూ, మతప్రచారార్థం తొలిసారిగా, పరదేశాలకు వెళ్ళిన సన్యాసిని నేనే అని చెప్పేవారూ, తమ జాతిచరిత్ర నెరుగని వారే! ఇలాంటి సంఘటనలు ఎన్నోసార్లు జరిగాయి. అవసరమైనప్పుడల్లా, భారతీయ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానప్రవాహం వెల్లువలా లోకాన్ని ముంచెత్తుతూ వచ్చింది.

రాజకీయ ప్రచారాన్ని రణగొణధ్వనులతో, యోధులతో సాగించవచ్చు. అగ్నిని కురిపించి, కత్తిని జళిపించి, లౌకిక జ్ఞానాన్నీ సంఘనిర్మాణ విజ్ఞానాన్నీ విరివిగా ప్రచారం చేయవచ్చు. కానీ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానదానం కళ్ళకు కనిపించకుండా, చెవులకు వినిపించకుండా కురుస్తూ, రోజూ పువ్వుల రాసుల్ని వికసింపజేసే మంచులాగా నిశ్శబ్దంగా జరగవలసి ఉంది. భారతదేశం నిరాడంబరంగా, లోకానికి మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తూ వచ్చిన దానమిదే!

మిత్రులారా! నేను అవలంబించే విధానాన్ని తెలియజేస్తాను వినండి. భారతదేశంలోనూ, ఇతర దేశాల్లోనూ మన పారమార్థిక ధర్మాలను బోధించడానికి తగినవారుగా మన యువకుల్ని తయారు చేయడానికై భారతదేశంలో కొన్ని సంస్థలను నెలకొల్పాలి! ఇప్పుడు మనకు కావలసింది బలిష్ఠులు, జవసంపన్నులు, ఋజువర్తనులు, ఆత్మ విశ్వాసపరులు అయిన యువకులు. అలాంటి వారు నూరుమంది దొరికినా, ప్రపంచం పూర్తిగా పరివర్తన చెందగలుగుతుంది!!

ఇచ్చాశక్తి తక్కిన శక్తులన్నీ కన్నా బలవత్తరమైంది. అది సాక్షాత్తూ భగవంతుని దగ్గరి నుండి వచ్చేదే కాబట్టి దాని ముందు తక్కినదంతా లొంగిపోవలసిందే. నిర్మలం, బలిష్ఠం అయిన ‘ఇచ్చ’ (సంకల్పం) సర్వశక్తిమంతమైంది. దానిలో మీకు విశ్వాసం లేదా? ఉంటే మీ మతంలోని మహోన్నత ధర్మాలను ప్రపంచానికి బోధించడానికై కంకణం కట్టుకోండి. ప్రపంచం ఆ ధర్మాల కోసమై ఎదురుచూస్తోంది. అనేక శతాబ్దాలుగా ప్రజలకు క్షుద్రసిద్ధాంతాలు నేర్పడం జరిగింది. వారు వ్యర్థులని ప్రపంచమంతటా బోధలు జరిగాయి. ఎన్నో శతాబ్దాల నుండి వారు ఈ బోధనల వల్ల భయభ్రాంతులై, పశుప్రాయులైపోతున్నారు. తాము ఆత్మస్వరూపులమనే మాటను వినడానికైనా వారెన్నడూ నోచుకోలేదు. “నీచాతినీచుడిలో కూడా ఆత్మ ఉంది. అది అమృతం, పరమ పవిత్రం, సర్వశక్తిమంతం, సర్వవ్యాపకమైనది” అని వారికి ఆత్మను గురించి చెప్పండి. వారికి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ప్రసాదించండి. ❖



మూలం: శ్రీ రామకృష్ణ ప్రభ - ఫిబ్రవరి 2014

ప్రసవములలో ప్రథమ సహాయము.

Prasavamulalo prathama Sahayam.
గ్రంథ కర్త

ప్రమాదములలో ప్రథమ చికిత్సయను

గ్రంథమును రచించిన

హానరబులు డాక్టరు. యు. రామారావు


ప్రీతిక.



ప్రసవములను గూర్చిన విషయములను మామూలు మాటలలో సులభముగా స్త్రీలకు బోధపడు రీతిని ముఖ్యముగా స్త్రీలకు వివరించుటకే యీ గ్రంథము వ్రాయబడెను. ప్రసవములలో ప్రథమసహాయ పద్ధతి మాత్రమే వివరింప బడెను. అవసరముగా ప్రసవము కలిగినపుడు డాక్టరు గాని మంత్రసాని గాని వచ్చులోగా చేయవలసిన పని మాత్రమే దీనియందు వివరింపబడెను. ఈ ప్రథమ సహాయపద్ధతి తెలియక పోవుటచే చాల మందికి ప్రాణాపాయము గూడ కలుగుచున్నది. డాక్టరుతోను మంత్రసాని తోను అవసరము లేకుండచేయుటకీ గ్రంథము వ్రాయబడలేదు. ప్రమాదములు కలిగినపుడు ప్రథమ చికిత్సను చేయుటను గూర్చి నాచే వ్రాయబడిన గ్రంథము నాదరించి నటులే యీ గ్రంథమును గూడ దేశీయు లాదరింప గలరని ఆశించుచున్నాను. ఆ గ్రంథమున కిదివరకే చాల సారులు పునర్ముద్రణములు గూడ జరిగెను. ఈ గ్రంథము అంగ్లభాష రానివారికి గూడ నుపకరించుటకు దీనిని యీ రాష్ట్రమునందలి వివిధ దేశ భాషలలోనికి గూడ ననువదింప జేయుచున్నాను.

గ్రంథకర్త.

విషయముల పట్టిక



ప్రకరణము.	పుట.
1 వ స్థికము వివరణము	1
2. వ స్థికములోని వక్రములు	5
3. గర్భోత్పత్తి లక్షణములు	8
4. గర్భవతుల ఆరోగ్యము	12
5. గర్భవతుల వ్యాధులు	16
6. గర్భవతులకు కలుగు ప్రమాదములు	20
7. సహజమగు ప్రసవము	23
8. ప్రసవమైన పిమ్మట జాగ్రత్త పుచ్చుకొనుట	32
9. అసహజమగు ప్రసవ వేదన	42
10. ప్రసవసమయమున పరిశుభ్రత	52
11. ప్రసవానంతరము కలుగు చిక్కులు	63
12. శిశు పోషణము	67
13. పుట్టిన తరువాత శిశువులకు కలుగు వ్యాధులు	74
14. శిశువుల ఆహారము	79



స్త్రీలు ప్రసవించుటలో ప్రథమ
సహాయము.




మొదటి ప్రకరణము.

వ స్థిక (పెల్విసు) వివరణము.

(వ స్థికమనగా పొత్తి కడుపు చుట్టునుండు అస్థి పంజరము)

శిశువు తల యేయే మార్గముల గుండ వెళ్ల వలసియుండునో వాని కొలతకంటె శిశువు తల కొలత హెచ్చుగానుండుట వలననే ప్రసవ సమయమునందు కలుగు సహాయములలోను, యిబ్బందులలోను అధికభాగము కలుగుచుండును. కావున యీ భాగముల కూర్పును గూర్చి అందరను కొంతవరకైన తెలుసు కొనవలసిన అవసరము కలిగినది.


బిడ్డ పోవలసిన శల్యద్రోణము (బోనీ బేసిను) నే వస్త్రీక



ఈ పటమునందు వస్త్రీక
స్థానము చూపబడెను.

(వెల్విసు) మని యందురు, అది
వెన్నెముకకును, తొడలకును మధ్య
నున్నది. వెన్నెముకపై నాధార
పడి వస్త్రీకము తొడలపై నానుకొని
యుండును. చాల తరుణాస్తుల
(గిజిలు) వలనను గట్టి బంధముల
(లిగమెంటుస్) వలనను, కూర్చుండిన
చాల యెముకల సముదాయము వల
ననే యీ వస్త్రీక మేర్పడినది. దీని
కిరుప్రక్కలను కటిపాత్రము (యిలి
యం) అనబడు వెడల్పుగు చదుసైన
యెముకయున్నది. వస్త్రీకమొక విసన
కర్రవలెవిస్తరించియున్నది దాని పై
కొనపొడుగునను ఒక దళముగు అంచు
కలదు. అందువలననే తుంట్లు స్ఫుట
ముగా కనబడును. ఈ అంచు ముందు


భాగము వరకు వ్యాపించినది. అంచు గుండుకు బాగుగా పొటకు
రించుకొనిన దీనిని గజ్జముడత వెలుపల కొవ్వు తాకి తెలుసుకొన
వచ్చును. గెండు ప్రక్కలనున్న యీ యుష్ణవృత్త (పొడెక్సన్న)
మధ్య భాగము వెడల్పు 9-10 అంగుళములును గెండు కొనల మధ్య
భాగము వెడల్పు 11 అంగుళములు నుండును. వస్త్రీకము వెనుక
భాగమున త్రికాస్థి (కాక్రం) అనబడు వులి ఆకారము గల యెముక



యొకటి కలదు. దాని ముందు
భాగము అరచెయ్యివలె పల్లము
గానుండును. త్రికాస్థి అడుగు
కొనకు అంటుకొని త్రికాస్థి
పుచ్చము (కోకిల్స్) అనబడు
నొక చిన్న తోకవంటి యెము
క కలదు. స్త్రీలు ప్రసవించు

నపుడు శిశువు తల వెలుపలికి వచ్చుటకు దారికడ్డము కలుగుండుటకు
త్రికాస్థి పుచ్చము అనబడు నీ యెముకకొన ఒక అంగుళము సుమారుగా
వెనుకకు త్రోయబడును. వస్త్రీకమునకు పీఠముగానున్న ఆసనాస్థి (యిస్సీ
యం) అను యెముక వస్త్రీకముకు, దీగువను వెలుపలను అమర్చబడెను.

వస్త్రము ఆకారమును మొత్తముమీద మనము పరిశీలించినచో అది యొక లోతగు మూకుడు (బేసిను) వలెనే యుండును. వస్త్రము అంచు వస్త్రములోని గుల్లలోనికి పోవలగు గుండ్రని మార్గమైయున్నది. దాని గుండ్ర పోవునట్టి వన్నియును నూటిగా అధోముఖముగా పోకుండ




వస్త్రము యుండవలసిన సహజ స్థితి.

క్రిందకు వెనుకకు తిరుగుచు నుండుటకు వీలగునట్లు యీ రంధ్రము కొద్దిగా వంచబడును. వస్త్రములోని గుల్ల భాగము త్రికాస్థి (కాక్స్) లోని పల్లమువలన వక్రములేని గొట్టము వలె నుండక ముందు వాటుము గా వంగియుండును. వస్త్రము ద్వారము చుట్టును పీఠశల్యగ్రంథులున్నవి. ఈ ద్వారము డయ మండు ఆకారముతో అధోముఖముగా ముందు వంకగానున్నది. కావున శిశువు జనించునపుడు దాని తల మొదట అధోముఖముగను, వెనుకకు ను జరుగును. పిమ్మట త్రికాస్థియందలి పల్లముగుండ వక్రముగా ముందుకు పోవును. చివరకు ముందు వంకగా జననోద్రయ ద్వారమున (వ్యూబిను) కు దిగువగా వెలుపలికి వచ్చును.

రెండవ ప్రకరణము.

వస్త్రము అనగా కటిర చక్రములో వక్రతలు.

వస్త్రము ఆకారములో మార్పుమైననుండినచో, ప్రసవ వేదన కలిగిన వెంటనే దానిని కనుగొనినచో కొన్ని శస్త్ర చికిత్సలవలన సుఖ



వక్ర వస్త్రము.

ప్రసవమును కలిగించుట కవ కాశము కలదు. దానిని కను గొనుటలో ఆలశ్యము జరిగిన యడల తల్లికిని పిల్లకునుగూడ అసాయ స్థితి కలుగును. ఏల ననగా నీటి తీర్తి పగులుటయు ను, గర్భాశయము శిశువుకు బాగుగా బిగుసు కొనిపోవుట

యును జరిగిన వెనుక శస్త్ర చికిత్సచేయుట చాల కష్టము. కావున వస్త్రములో వక్రత కలిగినచో వెంటనే కనుగొని తక్షణమే వైద్యుని రావించుటకు వీలుగానుండుటకు వస్త్రములోని సామాన్య వక్రతలన

గూర్చి గూడ కొంత తెలుసు కొనవలసిన అవసరము కలదు. వస్త్రీకములో కలుగు కొన్ని విధములగు వక్రత లీ దిగువను వివరింపబడెను.

- (1) మిక్కిలి చిన్నదిగానుండుట.
- (2) చదునుగా మారుట.
- (3) నలిగిపోవుట లేక ముడతలు పడుట.
- (4) మారుమూపు కలుగునట్లు మెలి పెట్టుబడుట.
- (5) దానిలోపలి భాగమునుండి కలిగిన మొలకలు దాని కిడ్డ పడుట.

గర్భవతి ఆకారములో యీ దిగువ చూపబడిన మార్పులు కనబడినచో వస్త్రీకమునందు వక్రతలు కలిగినవని అనుమానింప వచ్చును.



1

2

(1) వెన్ను వంకరగానుండుట.

(2) కాళ్లు వంకరగానుండుట


లేక ఒక కాలికంటె మరియొక కాలు పొడుగుగానుండుట.

- (3) రొమ్ము లేక వక్షస్థలము వక్రముగానుండుట.
- (4) కడుపు ముందుకు వంగుట,



3

4



5

- (5) సరిగా పెరుగక పోవుట,

ఈ లక్షణములలో నేనైనను సరే స్త్రీలకున్నచో వారు గర్భవతులైన యెడల డాక్టరులతో నాలోచించి ముందుగానే తగిన యేర్పాటులను చేసుకొనవలెను.

మూడవ ప్రకరణము.

గర్భోత్పత్తికి సూచనలు.

గర్భోత్పత్తియైన పిమ్మట సామాన్యముగా చాంద్ర మాసమున 10 నెలలకును, యింగ్గీపు మాసమున 9 నెలల యేడు రోజులకును లేక 280 రోజులకును స్త్రీలు ప్రసవించెదరు. కడపట బహిష్టయిన మొదటి రోజునుండియు లెక్క ప్రారంభమగును.

(1) ప్రేత్యవికారము (మోర్నింగుసిక్నెసు)

గర్భోత్పత్తియైన పిమ్మట మొదటి నెలలో కొందరికివెంటునేను, కొందరికి నెలాఖరులోగాను ఉదయమున ప్రేత్యగాభరా (మోర్నింగుసిక్నెసు) ప్రారంభమగును. కొంతమందికి ప్రసవమగు వరకునుగూడ యెన్నడును యీవికారముబాధమున్నగునవి కనబడకపోవుటగూడకలదు. మరి కొందరికివికారము మిక్కిలి హెచ్చుగానుండును. వారేమి తినినను వెంటనే వాంతి చేసుకొనుచుందురు. ఒక్క మెతుకైన కడుపులో నిలువదు. అట్టిచో వెంటనే డాక్టరును పిలువవలెను. లేనిచో గర్భస్రావము కలుగగలదు. అంతవరకును ఆవగింజల ముద్దను (మట్టడ్డ స్టాప్టరీ)

పొత్తి కడుపుమీద కొద్దిగా వేయవలెను. గెండు గంటల కొకసారి సిరియం ఆక్స్జిలేటును మూడు గ్రెయిసుల యెత్తు మ్రింగించుచుండవలెను. లేదా అరగంట కొకసారి ఒక ఔన్న నీళ్లలో టింక్చరు ఆఫ్ అయోడిను ఒక చుక్క వేసి త్రాగించుచుండవలెను. అందరికిని గూడ ఉదయమున నిద్ర లేవగానే వికారము కలుగును, గర్భోత్పత్తియై 12 వారములు గడువగానే యీ బాధ తగ్గిపోవును. అనగా నాల్గవ నెల రాగానే తగ్గిపోవును.

(2) ఋతు ప్రావము కట్టుబడి పోవుట

గర్భోత్పత్తికలుగకపూర్వముసరిగా 28 రోజులకొకసారి బహిష్టగుచున్న



చోఅట్టి స్త్రీలకు గర్భోత్పత్తియైనయెడలఋతుప్రావము కట్టుబడి పోవును. ఇదిసమ్యక్ మైనలక్షణము(కొత్తగాకాపురమునకు వచ్చిన పడుచులకు గర్భోత్పత్తి కాకుండనే వరుసగా మూడు నాలుగు నెలల వరకును ఋతు ప్రావము నిలచిపోవుచుండును. కొంత

మంది గర్భవతులైన పిమ్మట మూడు నాలుగు నెలల వరకును ఋతు

ప్రావము వెడలుచునేయుండును. మరి కొందరికి ప్రసవముగువరకును గూడ ఋతు ప్రావము వెడలుచునే యుండును. ఈ కడపటిపద్ధతులు అసాధారణములలో చేరినవి. కావున గర్భోత్పత్తి కలిగి నట్లు నిర్ధారణ యగుటకు డాక్టరు వడుగుటయే ఉత్తమము.

(3) స్తనములు పెరుగుట: సాధారణముగా మొదటి నెల నిండగానే పాలిండ్లు పెరుగవారంభించును.

(4) పాలిండ్లు నొప్పిగానుండుట, చనుముక్కులు నల్ల బడుట: మూడవ నెలలో నీలక్షణములు కనబడును, కొందరికి తెల్లగానుండు పలచని నీరు గూడ పాలిండ్లనుండి ప్రవించుచుండును.

(5) కడుపు పెరుగుట:

(6) శిశువు కదలుట: నాలుగవ నెలలోను అయిదవ నెలలోను కడుపులో శిశువు కదలుట చూలంతరాలికి తెలియును, అప్పుడు చాల మందికి చాలనిస్త్రాణగాగూడనుండును.

(7) కడుపులోనున్న శిశువు గుండెకొట్టుకొనుట: తలగడ క్రింద వాచీని పెట్టుకొనిన దాని ధ్వని యెంత మెల్లగా వినబడునో అటులనే కడుపులోనున్న శిశువు గుండెలు కొట్టుకొను చున్న.

ధ్వని మొదట అయిదవ నెలలో అంత మెల్లగా వినబడును, తరువాత నది క్రమముగా స్పష్టముగా వినబడుచుండును. తుంటియొక్క కవర్లనుండి బొడ్డు వరకును ఒక గీతను గీసినచో దానికి మధ్యగా నొకపుడు కుడి ప్రక్కను మరొకపుడు యెడమ ప్రక్కను యీ ధ్వని వినబడును.

(8) కడుపులో శిశువు బాగుగా తిరుగుట: ఆరవ నెల నిండిన పిమ్మట వట్టి చల్లని చేతిని క్రింద కడుపుమీద పెట్టినచో యీ కదలిక బాగుగా చేతికి తగులును.

(9) గర్భవతి భావములు మారుచుండుట, జిహ్వాచా వల్యము, కోరికలు: గర్భవతికి అనేక కొత్త వస్తువులపైని కోరిక కలుగుచుండును. కొందరు విజాతి పదార్థములనుగూడ తిన గోతుచుందురు.

నోటిలో లాలా జలము విస్తారముగా కలుగుట, కాళ్ల నరములు పొంగుట, పంటినొప్పి మున్నగునవి గూడ కొందరికి కలుగును.

గర్భవతి కాగానే ప్రతి స్త్రీయును తన పల్లను దంత వైద్యుని చే విధిగా పరీక్ష చేయించు కొనవలెను. వానిలో నేవైన లోపము లున్నచో వెంటనే చికిత్సగూడ చేయించు కొనవలెను.

నాల్గవ ప్రకరణము.

కడుపులోనున్న రోజులలో శ్రీల ఆరోగ్యము.

సుఖ ప్రసవము కలుగవలె ననియును, అందమును ఆరోగ్యమును గల శిశువు జనింప వలెననియును కోరు శ్రీలు నెల తప్పినది మొదలు శిశువు జనించు వరకును నవ మాసములును ఆరోగ్య విషయమున చాల శ్రద్ధను చూపవలెను. చూలు నిలుచుట శ్రీలకు చాల సహజ భర్త మే గాన సరియగు నంగ సౌష్ఠ్యము గల శ్రీలు ఆరోగ్యమును గూర్చి శ్రద్ధ వహించుచున్నచో సుఖ ప్రసవమును గూర్చి యెట్టి ఆందోళన మును చెంద నవసరము లేదు. ఆరోగ్యవతులుగా నున్నవారు పద్ధతుల ను అలవాటులను మార్చ నవసరము లేదు. ఆహారము, బట్టలు, ముచి గాలి, కాల విరేచనము మున్నగువాని విషయమున మాత్రము శ్రద్ధ గలిగి యుండవలెను.

ఆహారము.

రుచులను పూర్తిగా వదల నక్కర లేదు గాని, రుచులకే ప్రా ధాన్య మియ్యగూడదు. త్వరగా జీర్ణమగునట్టియు పుష్టి నిచ్చునట్టి

యు ఆహారమును బాగుగా తీనుచుండవలెను. కడుపులోనున్న శిశువుకు గర్భవతి రక్తమునుండియే పుష్టి కలుగుచుండును. కావున పుష్టి కరములగు పదార్థములనే తీనుచుండ వలెను. లేనిచో శిశువు లోపల సరిగా పెరుగదు. జీర్ణ చాపల్యము వలన అనారోగ్యకరములగు చిరు తిండ్లను తినగూడదు. చాల కారమును ఘాటును గల వస్తువులను పూరగాయలు పచ్చళ్ళుమున్నగు వానిని వీలైనంతవరకు వదలి వేయ వలెను. మంచి పాలను విస్తారముగా త్రాగుచుండవలెను. సరిగా కాల విరేచనమగుటకు, పండ్లను, వుడికించిన ఆకు కూరలను, విస్తారముగా తీనుచుండ వలెను. మలబద్ధము కలిగినచో ఆరోగ్యమునకు భంగము కలుగుటయే గాక ప్రసవ సమయమున గూడ సుఖ ప్రసవము కలుగుట కభ్యంతర మేర్పడును. నెలలు హెచ్చిన కొలదియు ఆహారమును తగ్గించుచుండవలెను గాని రోజుకు మూడు నాలుగు సారులు కొద్ది కొద్దిగా తీనుచుండ వలెను. మలబద్ధము కలిగినచో రాత్రి పరుండ బోవునపుడు రెండు మొదలు నాలుగు మిల్లి గరిటెల (టీ స్పూను) ఆముదమును ప్రతిదినమును త్రాగుచుండవలెను. ఆముదమును త్రాగ లేనిచో రాత్రి పరుండ బోవునపుడు పాలలో ఒకటి స్పూను లికోరిసు పవుడరును కలిపి త్రాగుచుండవలెను. అది గూడ సరి పడనిచో డాక్టరును కనుగొన వలెను.

బట్టలు.

భారత దేశమునందలి సీతోష్ణ స్థితిని బట్టియు యిచట స్త్రీలు చీరలను కట్టు పద్ధతిని బట్టియు గర్భవతులు బట్ట కట్టుటలో నెట్టి మార్పును చేయ నవసరము లేదు. సాధారణముగా మన దేశమున స్త్రీలు చాల సన్నని చీరలనే వదులుగా కట్టెదరు గాన, శరీరమున రక్తము సరిగా ప్రవహించుట కెట్టి అభ్యంతరమును కలుగదు. రక్తము అన్ని అవయవములకును సరిగా పోవుచునేయుండును. రోమ్ము పైనను కడుపుపైనను బట్ట నెప్పుడును కప్పియే యుంచవలెను గాన వూలు చొక్కానుతోడునుకొని యుండుట మంచిది. ఆకస్మికముగ సీతోష్ణ సంబంధములగు మార్పులు క్షిణిక తగులగూడదు. వేసవి కాలములో వూలు చొక్కాను తోడుగుట స్త్రీలకు కష్టముగా తోచవచ్చును గాని వూలు వేడిని ఆకర్షింపదు. తేమను బాగుగా హరింప జేయును గాన వేసవిలో చెమటను ఆర్చివేయును. సీత కాలములో శరీరమునందలి వేడినినిలిపియుంచును. బిగువగు పటకాలను, వడ్డ్యాణములను గర్భవతులు పెట్టుకొన గూడదు.

విశ్రాంతి.

గర్భవతులు యే పనులను చేయగూడదనియును మామూలు గృహకృత్యములను గూడ చేయగూడదనియును చాల మంది భావించు

చుందురు. బరువువస్తువులను పైకెత్తుట, బరువు పదార్థములను మోయుట పరుగెత్తుట శరీరమున కధికమగు నలసట కలుగజేసుకొనుట మున్నగు పనులు చేసినచో చాల హాని కలుగుట నిశ్చయమే కాని తగిన శరీర పరిశ్రమ చేయక పోవుట గూడ మంచిది కాదు. ఆరోగ్యవతియగు స్త్రీ ఎనిమిదవ నెల కచ్చువరుకును మామూలుగా గృహ కృత్యముల నన్నిటిని చేయుచునే యుండవచ్చును, ఆరోగ్యము సరిగా నుండుటకు శరీరమునకును మనసునకును తగుమాత్రమగు పరిశ్రమ ముఖ్యపరమే యగును. సాధారణముగా రోజుకు ఒక గంట ఆరు బయట శరీర పరిశ్రమను చేయదగును. కాని భారత దేశమునందలి ఆచార వ్యవహారములు, పద్ధతులు మున్నగు వానిని బట్టి చాలమంది కిది సాధ్య పడదు, ఆరు బయట సికారు నెళ్లుటకు గూడ చాల మంది కవకాశము కలుగదు. కావున వారింట్లలో నైన లేచి తిరుగుచు గృహ కృత్యములను చేయుచుండుట చాల అవసరమే యగును, గర్భవతి పరిశుభ్రమగు గాలిని విస్తారముగా పీల్చుచుండవలెను. లేనిచో ఆమెకును, బోనున్న శిశువుకునుగూడ అనారోగ్యస్థితి కలుగును.

అయిదవ ప్రకరణము.

చూలింత గాండ్రకు కలుగు జబ్బులు.

(1) విస్తారముగా వాంతులగుట:-గర్భవతులకు కలుగు వేవిళ్లకు యెట్టి చికిత్సయును అవసరములేదు సరిగా విరేచనముగుటకు మాత్రము సాధనముచేయు చుండవలెను. ఉదయమున నిద్రలేవగానే నోరుపట్టుగలిగి నంతటి వేడివేడి నీళ్లను ఒక గ్లాసునీళ్లుపీల్చి త్రాగుచున్నచో వికారమును వాంతులను తగ్గును. కొంత మందికి యేమి తినినను గూడ వాంతి యగు చునే యుండును. వారు ఆహారము లేక మాడవలసిన గతిలో నుందురు. లోపల నేమియును నిముడదు. అట్టి స్థితిలో డాక్టరు నడుగవలసి నదే. అతడు వచ్చులోపల 15 నిముషముల కొకసారి ఒక బౌన్సు నీళ్లలో ఒక చుక్క టింక్చరు ఆఫ్ అయోడిను వేసి త్రాగించుచుండ వలెను.

(2) మూత్ర పిండ వ్యాధులు:—నెలలు మదిరిన పిమ్మటనే సాధారణముగా మూత్ర పిండ వ్యాధులు కలుగును. ఈ వ్యాధు లున్నచో బలమైన తలనొప్పి దృష్టి మాంద్యము, మూత్రము కొద్దిగా

పోవుట, మూత్రములో శ్వేత ధాతువు విస్తారముగా పడుచుండుట శరీర మంతయును ముఖ్యముగా ముఖమును పొంగుటమున్నగు లక్షణములు కలు గును. అప్పుడు మిన్నకుండ గూడదు. మిన్నకున్నచో విస్తారముగా యీడ్పులు కలుగును. తల్లియును శిశువును గూడ అపాయ స్థితిలో మం దురు. వెంటనే డాక్టరును పిలువవలెను, ఈలోగా పాలను మాత్రమే తాగించుచుండవలెను. విరేచనము సరిగా నగుటకు సాధనము చేయవలెను.

(3) రక్తము పలచబడుట:—రక్తము పలచబడినచో చూలింత గాలు పాలిపోవును. కాళ్లును, గుహ్యంగములును వాచును. వెంటనే వైద్యుని సహాయమవసరము. అంతవరకును రోగిని ఒరిగియుండు నట్లు పరుండ బెట్టవలెను. బాలీసు మున్నగు వాని కానుకొని పరుండ వలెను.

(4) రక్తనాళములు ఉబ్బుట:—క్రింది అవయవములలోని రక్తనాళములు తరుచుగా విస్తారముగా ఉబ్బును. ఒకప్పుడు పగులుటకు గూడ సిద్ధమగును. ఆ భాగమునందు రబ్బరుతో గాని, సాగునట్టి స్వభావముగల మరియొక దానితో గాని తేలికగా కట్టు కట్టవలెను. కాలివేళ్ల వద్దనుండి కట్టుట (బాండేజీ) ప్రారంభించి పైకి కట్టుకొని పోవలెను. నడువగూడదు. కాలికి విశ్రాంతి నియ్యవలెను.

(5) పచ్చకామెల వ్యాధి:—గర్భవతులలో కొందరికి పచ్చకామెల వ్యాధిలో చాల ప్రాణాపాయకరమగు రకము పచ్చకామెల వ్యాధిగూడ కలుగుచుండును. చాలింతరాలి మూత్రము మిక్కిలి పచ్చగానుండినను, ఆ మూత్రము బట్టమీద పడినచో బట్టకు పసుపు డాగు కలుగుచుండినను కనులలోని తెల్లగ్రుడ్లు గూడ పసుపు రంగుగా మారినను, విరేచనము మట్టి రంగుగానుండినను తక్షణమే వైద్యుని పిలువవలెను.

(6) మూలశంఖ లేక మూల వ్యాధి:—గర్భవతులు మూల శంఖవలన చాల బాధ పడుచుండురు గాని ప్రసవించగానే చాల మంది ఈ వ్యాధి తగ్గిపోవును. రాత్రి పరుండ బోవునపుడు పాలలో రెండు టీ స్పూనులు ఆముదము వేసి గాని ఒక టీ స్పూను లికోరిసు పొడరును వేసి గాని త్రాగుచుండుట కంటే గర్భవతులకు మరే చికిత్సయును యిందులకు చేయ వీలులేదు. ఇటుల పుచ్చుకొనుచున్నచో ఉదయమున పిష్టము కట్టకుండ విరేచనము సరిగా నగుచుండును వీని వలనగూడ విరేచనము కానిచో వైద్యుని పిలువవలెను. మొలకలపైని వేడినీళ్ల కావటము పెట్టవలెను. కరక్కాయల ఆయింట్లుమెంట్లు, నల్లమందు ఆయింట్లుమెంట్లు, హెజిలీను మున్నగువానిని పైన రాయవలెను. అవి శాంతి ప్రదములుగా నుండును.

(7) గుహ్యంగములలో దురద:—కొంతమంది స్త్రీలకు దురద వలన భరింపరాని బాధ కలుగును. సావము వలనను, అతి మూత్ర వ్యాధి వలనను గూడ నీ దురద కలుగును. వైద్యునికి తెలుపవలెను. ఈ లోగా రోజుకు రెండు మూడు సార్లు వెచ్చని నీళ్లలో బొరాక్సును కలిపి గుహ్యంగములను తడుపుచుండవలెను. తరువాత జీంకు ఆయింట్లుమెంట్లు రాయవలెను.



ఆరవ ప్రకరణము.

గర్భవతులకు కలుగు అపాయములు.

గర్భస్రావము, అకాలప్రసవము మున్నగు నపాయములు గర్భవతులకు కలుగుచుండును.

(1) గర్భ స్రావము

నాలుగవ నెల రాకముందే గర్భాండము వెలుపలకు వచ్చినచో దానిని గర్భస్రావమందురు. అధికమగు భీతి, విపరీతమగు దుఃఖము, గొప్ప అవటు ఘోరవార్తను వినుట, భయంకరము లగువానిని చూచుట, మున్నగువాని వలనను, ఆకస్మికముగ భావోద్దేకము కలుగుట వలనను, గాఢములగు విరేచన సాధనముల వలనను, అధికముగ జ్వరమువచ్చుట వలనను గూడ గర్భస్రావముకలుగును. ముందుగా కడుపునొప్పియును, రక్తస్రావమును తోలువొల్ల కలుగును. అది కలిగిన వెంటనే చికిత్సచేయించ వలెను. వైద్యుడు వచ్చులోగా గర్భవతి శాంతముగా పరుండునట్లు చేయవలెను. చూలింతరాలు పాలిపోవుట

సామ్యసిలుట, వంటినిండ జిగటగానుండు చెమట బట్టుట మున్నగునవి కలిగినచో గర్భాశయమునుండి రక్తము స్రవించు చున్నదని గ్రహింపవలెను. ఆహారమునకు గుడ్డబంతి నడ్డుపెట్టి రక్తస్రావమును నిలుపుటకు ప్రయత్నించవలెను. ఇందులో సంతకప్త మేమియును లేదుగాని, శ్రద్ధమాత్ర మవసరము. టైరిలైజుచేసి సిద్ధపరుపబడిన గాజు పేలికలున్నచో వానిని తీసుకొనవలెను. అవిలేనిచో అరగంటసేపు గాజును (ఒకరకముగుడ్డ) నీళ్లలో వేసి బాగుగా చురుగనిచ్చి పిమ్మట ఆ గుడ్డపేలికలను వాడవలెను. ఈ పేలికలను గర్భాశయముయొక్క మెడచుట్టును గట్టిగాదోపవలెను. పిమ్మట యీ రీతినే టైరిలైజుచేయబడిన మాదివుండలను దాని పొడుగునను బాగుగా బిగించిపెట్టవలెను. ప్రతిపుండను గూడ గట్టిగా నొక్కిపెట్టవలెను. ఈ రీతిగా దానిలో పట్టునన్ని పుండలను బిగించి పెట్టినవెనుక గర్భవతిని వెల్లకిల పరుండ బెట్టవలెను. గుహ్యంగములను కప్పుటకొక రుమాలును వానిపైనివేసి దానిపైని విశాలమగు నొక పట్టీతో కడుపుచుట్టును గట్టిగా కట్టవలెను. ఈ పనులన్నీటిని చేయజాలనిచో చూలింతరాలిని వెల్లకిల పరుండబెట్టి గుహ్యంగములపైని తడిబట్టను కప్పుచుండవలెను. తక్షణమే డాక్టరును పిలువనంపవలెను.

(2) అకాల ప్రసవము

28 వారములలోగా అనగా శిశువుకు జీవశక్తి కలుగకముందే బిడ్డపుట్టినచో పిండప్రాసము అనియును, 28 వ వారము గడచిన వెంటనే శిశువుజనించినచో అకాల ప్రసవమనియు నందురు. ఈ అసాయము కలుగనున్నపుడు గూడ డాక్టరును పిలువవలెను. అతడు వచ్చువరకును 24 వ శేజిలో తెలుపబడెడు రీతిని మామూలు ప్రసవమునందు పుచ్చుకొనునట్టి జాగ్రతలనే యిపుడు గూడ పుచ్చుకొనవలెను.

1. రక్తప్రాసము
2. విస్తారముగా బాంతులు
3. తలనొప్పి, దృష్టిమాంద్యము, చేతులు ముఖము పొంగుట
4. పచ్చ కామెల
5. వస్తికమున వక్రతకలదను అనుమానము
6. మూత్రము నిలువకుండ పోవుట లేక మూత్రముపోవు నపుడుబాధ, మూత్రమునరిగా పోకుండుట మున్నగునవి కలిగినపుడు యేమూత్రమును ఆలస్యము చేయకుండ వెంటనే డాక్టరును పిలువవలెను.

ఏడవ ప్రకరణము.

సహజమగు ప్రసవవేదన లేక సుఖ ప్రసవము.

ప్రసవ వేదన అనగా శిశువు జనించుటకు ముందు జరుగు పద్ధతి. తొమ్మిది నెలలును నిండిన పిమ్మట కలుగు ప్రసవము సహజమైనది



గావున అట్టి ప్రసవమునందు ప్రమాదము చాల తక్కువగా నుండును. ప్రసవ వేదన త్వరలో ప్రారంభమగు ననగా యీ దిగువ లక్షణములు చూపింంతకాలికి కలుగును:—కడుపు ముందుకు అధోముఖముగా వ్రాలును. వల్ల చాల తేలికగా నున్నట్లా మెకు తోచును, తరుచుగా మూత్ర విసర్జనము చేయుటకు బుద్ధి పుట్టును. మల ద్వారము గుండ జిగట పడును. ఒకపుడు రక్తపు జాడ గూడ జిగటలో కనబడును. కొం

సహజమగు ప్రసవ మునందు శిశువు తల యుండు రీతి. కొందరికి ఒకటి రెండు రోజులు ముందుగాను కొందరికి కొన్ని గంటలు ముందుగాను యీ లక్షణములన్నియును గాని, కొన్నిగాని కనబడును. కొన్ని

నోజులు ముందుగా కానుపునొప్పులవంటి నొప్పులు కొందరికీ కలుగును. మరికొందరికి కొద్దిగా రక్తము గూడ పడును. రక్తము పడినచో తక్షణమే డాక్టరును పిలువవలెను. ఈ నొప్పులలో (1) వట్టి నొప్పులు, (2) నిజమైన నొప్పులు అని రెండు రకముల నొప్పులున్నవి. వట్టి నొప్పులు కాల నిర్ణయము లేకుండనే వచ్చుచుండును. గాని అవి చాల సేపుండవు. బహు కొద్దికాలమే యుండును. అవి ముందు భాగమునందే సామాన్యముగా కలుగును. శీర్షకోశమునందును, మలకోశమునందును లోప మేదైన కలుగుట వలనను అశీర్షకారియగు పవార్థమును తినుట వలననుగూడ నిట్టి వట్టి నొప్పులు కలుగను. వెంటనే ఒక మోతాదు అముదమును త్రాగవలెను. తేలికగా అరుగునట్టి ఆహారమునే తినుచుండవలెను.

(2) నిజమైన నొప్పులు:—శిశువు జనింపనున్నతరుని కలుగు నొప్పులు నిజమైన నొప్పులు. మొదటి నొప్పి వచ్చిన యెన్ని నిమిషములకు రెండవ నొప్పి వచ్చునో దాని తరువాత సరిగా అంతకాలముకే మరల నొప్పి వచ్చుచుండును. ఈ నొప్పులు మొదట చాల తక్కువగానుండును. తరువాత చాల హెచ్చును. పిమ్మట పూర్తిగా నిలిచిపోవును. ఈ నొప్పి మొదట వెన్నులో నారంభించి పొత్తికడుపు

దిగువ భాగమునకు పోవుచుండును. ఈ నొప్పులతో పాటు స్రావము కూడ కలిగినచో, నిజమైన నొప్పులారంభమైన వని తెలుసుకొనవలెను.

ఈ లక్షణములు కలిగిన వెంటనే పురిటి గదిలో ప్రక్క నమర్చవలెను. గట్టిగానుండు మెత్తనుగాని, కర్ర పలకలమర్చబడిన కర్ర మంచమునుగాని వేయవలెను. దాని మీద బ్లాంకెటును, ప్రక్క దుప్పటిని పరచి వాని పైని అయిలు క్లాతు ముక్కును గూడ వేసియుంచవలెను, అప్పటికి ఆరు గంటలలోగా విరేచన మయ్యుండనిచో వేడి నీళ్లలో సబ్బు కలిపి వానితో యెనీమా చెయ్యవలెను. లేదా ఒక మోతాదు అముదమును త్రాగించవలెను. ప్రసవ సమయమున బాగుగా విరేచనమైనచో గర్భాశయము సరిగా పనిచేయ గలుగును, పరిశుభ్రముగానుండును. యిబ్బంది యేమియును కలుగదు లేనిచో నొప్పులు బలమైనపుడు మలము ప్రక్కమీద విధిగా పడును.

ప్రసవ వేదనలో మూడు అంతరువులున్నవి:—

మొదటి అంతరువు.

నిజమైన నొప్పులారంభమగుటయే మొదటి అంతరువు. అపుడు కడుపు దిగువ భాగమున నొప్పి ప్రారంభమగును. క్రమముగా నడుము

లోనికిని, వెన్నులోనికిని వ్యాపించును. అటునుండి తొడలలోనికి గూడ దిగును. వీనినే కానుపు నోష్పలందురు. గర్భాశయ ద్వారము బాగుగా విడిపోవు వరకును యీ నోష్పలుండును. ఆ ద్వారము పూర్తిగా విడిపోగానే సాధారణముగా శిశువును కప్పియుండు నీటి నంచి చనిలి రుట్లును నీరువచ్చును. తొలిచూలు వారికి 11-12 గంటల వరకును. తరువాత కానుపులకు 6-8 గంటల వరకును యీ నోష్పలుండును. అంతకంటె అధిక కాలము వరకును యీ నోష్పలు తగ్గ కున్నచో యేదో లోపమున్నదని గ్రహించి వెంటనే డాక్టరును పిలువవలెను. డాక్టరు వచ్చువరకును చూలింతరాలు అటునిటు నడుచుచునేయుండవలెను. అప్పుడు శిశువుయొక్క భారము క్రిందకు దిగును గాన దానివలన గర్భాశయ ద్వారము విడిపో గలదు.

రెండవ అంతరువు.

గర్భాశయ ద్వారము పూర్తిగా విడిపోయినది మొదలు శిశువు జనించు వరకును రెండవ అంతరువు అనబడును. రెండవ అంతరువులో నోష్పలు చాల అధిక మగును. ఒక నొప్పికిని మరియొక నొప్పికిని మధ్య విరామము గూడ చాల తక్కువగును. ఒకసారి నొప్పి వచ్చినచో 30 మొదలు 60 సెకనులవరకునుండును. ఒక

నొప్పి తగ్గిన పిమ్మట మరి 5-6 నిమిషములకే మరల నొప్పి వచ్చుచుండును. శిశువు జనించ బోవువరకును యిటులే నోష్పలు వచ్చుచుండును. అప్పుడు మాత్రము నోష్పలు విడువకుండనే యుండును. మొదటి అంతరువునందలి బాధకంటె రెండవ అంతరువులోని బాధ మిక్కిలి హెచ్చుగానుండును. మొదటి అంతరువులో అరచినట్లు రెండవ అంతరువులో చూలింతరాండ్రు అరువరు గాని బాధనంతను దిగ మ్రింగుచు గట్టిగా మూలుగుచుండురు. నొప్పివచ్చినప్పుడు చేతికేదయందిన దానిని గట్టిగాపట్టుకొని బాధను భరించుటకునర్హ శక్తులను వినియోగించుచుండురు. అట్టి స్థితిలో చూలింతరాలిని పరుండ బెట్టవలెను. తల వైపున వంచమున కొక బట్టను బిగించి కట్టవలెను. నొప్పి వచ్చినప్పుడు దానిని భరించుట కాధారముగా ఆ బట్టను చూలింతరాలు పట్టుకొనుచుండును. లోపల శిశువు క్రిందకు దిగిన కొలదియూ మలకోశమునకు వత్తిడి అధిక మగును. అప్పుడు విరేచనము కానున్నట్లు చూలింతరాలికి గట్టి అనుమానము కలుగును. తొలిచూలు వారికి రెండవ అంతరువు ఒకటి రెండు గంటలుండును. ఇతరులకు 10-15 నిమిషములు మాత్రమే యుండును. అంతకంటె హెచ్చుకాలము వరకునున్నచో నేదో అసహజస్థితి కలిగినదని భావించి వైద్యుని పిలువ నంపవలెను. శిశువు

తల సహజముగాను యెట్టి ఆలస్యమును లేకుండను వెలుపలకు వచ్చినచో శిశువు మెడచుట్టును బొడ్డు నరము (కార్డు) చుట్టుకొని యున్న దేమో చూడవలెను. అది చుట్టుకొనియున్నచో శిశువు శరీరము దాని గుండ వెలుపలికి రావలగునట్లు దానిని తల పైకి త్రోయవలెను. లేదా వదులుచేయవలెను, ఈ గెండునుగూడ సాధ్యముకానిచో కత్తెరతో నానరమును కత్తిరించవలెను. అందువలన రక్తస్రావము కలుగకుండ ఆ నరము గెండుకొనలను ముడివేయవలెను,

మూడవ అంతరువు.

శిశువు జనించినది మొదలు మావి పడిపోవువరకును మూడవ అంతరువనబడును. శిశువు పుట్టినపిమ్మట 15-30 నిమిషముల లోగానే అందరికిని గూడ మావి పడిపోవును. అటుల పడనిచో డాక్టరును పిలువవలెను. శిశువు పుట్టినవెంటనే తల్లికి అధికమగు నుపశమనము కలుగును. అందువలన 10-15 నిమిషములవరకును సామ్యసిలిసట్టు పరుండియుండును. అటుపిమ్మట మరల నొప్పులు వచ్చును. మావిపడిపోవువరకును అటులనే కొన్ని నిమిషముల కొకసారి నొప్పులు వచ్చుచునేయుండును.

సహజమగు ప్రసవముగో శ్రద్ధపుచ్చు కొనవలసిన ముఖ్యవిషయములు మూడు.


(1) శిశువుతల వెలుపలికి వచ్చునపుడు తల్లి శరీరము నందేభాగమున ఒత్తిడి కలుగునో ఆ భాగమునకు అనగా జననద్వారము (పెరినియం) అనబడు వస్త్రీకమునందొక భాగమునకు తగినంత ఆసాను యియ్యవలెను. లేనిచో అది చీలిపోవును. తొలిచూలు వారికి విషయమున అధికమగు శ్రద్ధ అవసరము, చేతిమీద శుభ్రమైనబట్టను వేసుకొని చేతులతో గట్టిగా ఆ భాగమును పట్టుకొనినచో అదియే మంచి ఆసానగును.

(2) శిశువు నోటిలో నున్న చీము, మైల మున్నగువానిని తీసి వేయవలెను.

(3) శిశువు జనించిన వెంటనే గర్భాశయద్వారము మూసుకొని పోవునట్లు చూడవలెను, అందులకు శిశువు జనింపగానే దగ్గిరనున్న స్త్రీలలోనొకరు బాలింతరాలి గర్భాశయ ద్వారముపై చేయివేసి ఒక మాదిరిగా అణచిపెట్టుచుండ వలెను. మావిపడి పోవువరకుగాని లేక ఆ ద్వారము పూర్తిగా మూసుకొని పోవువరకుగాని చేతినితీయగూడదు. ఆ ద్వారము మూసుకొని పోయినచో మలకోశము దిగువను ఒక గట్టి గుండ్రని బంతివలె చేతికితగులును. ఆ ద్వారముటుల మూసుకొనిపోనిచో రక్తస్రావము కలుగవచ్చును. అప్పుడు వెంటనే డాక్టరును పిలువవలెను.

(4) బొడ్డు కోయుట:— (ఈ విషయమును గూర్చి 9 వ అధ్యాయము చూడవలెను)

నొప్పులు పడుచున్నపుడు దాహము విస్తారముగా నున్నచో చల్లనినీళ్లను గాని మంచు గెడ్డవేసిన పాలనుగాని త్రాగ నియ్యవలెను.



గట్టి ఆహారమునియ్య గూడదు. ఇచ్చినచో వాంతులు కలుగ గలవు. ఒక నొప్పికిని మరయొక నొప్పికిని మధ్య విరామములో గర్భవతికినిద్ర పట్టినచో నిద్రా భంగము కలిగింప గూడదు. మావి పడుట ఆలస్య మైనపుడు అది

త్వరగా పడిపో వలెనని తొందర పడి నరమును (కార్డు) లాగగూడదు. మావి పడునపుడుగూడ నొప్పులు కలుగును. కొంత మందికి మావి గర్భాశయద్వారము (ఆరిఫిను) కడకువచ్చి నిలచి పోవును గాని యీ వలికిరాదు. అప్పుడు దానిని మెలిపెట్టి క్రమముగా తీసివేయవలెను.

మావి యెక్కుడైన . తెగిపోయినదో లేక పూర్తిగా వెలికి వచ్చినదో బాగుగా పరీక్షించి చూడవలెను. అది తెగిపోయి నట్టున్నచో లోపల కొంత భాగముండియుండును గాన నపుడు దాక్టరును పిలువ వలెను.



ఎనిమిదవ ప్రకరణము

శిశువు పుట్టినపిమ్మట జరుగవలసిన పని.

మావిని తీసివేసిన పిమ్మట పొత్తికడుపుకు కట్టుకట్టవలెను. బాలింతరాలు వెల్ల కిల పరుండియుండగా కట్టు పట్టిని కడుపుకు చుట్ట పెట్టవలెను. దానిని వెన్నక్రింద నుడిమెల్లగా రానియ్య వలెను, ఒకప్రక్క నొకరుండి దానిని వెన్నక్రింద దోపినపుడు గెండవప్రక్క నింకొకరుండి దానిని లాగవలెను. బాధకలుగకుండు నట్లును, గట్టిగాను ఆ పట్టిని కడుపుకు చుట్టి నేటిపిన్నులను దానికి గ్రుచ్చవలెను. మొదట పైభాగమున పిన్నును గ్రుచ్చవలెను. ఈ పట్టి చాల వెడల్పుగా నుండవలెను, సన్నముగానుండ గూడదు. గర్భాశయమొక గుండ్రని గట్టియుండ వలె చేతికి తగులనిచో ఒక రుమాలను మడతలు పెట్టిగర్భాశయము పైని పొత్తికడుపు చుట్టును కట్టబడిన పట్టిక్రింద దోపవలెను. అపుడు గర్భాశయమునకు సరియైన నొక్కుదల కలుగును. తరువాత శిశువును తల్లి ప్రక్కలో పరుండబెట్టి తల్లిరొమ్మును శిశువునోట పెట్టవలెను. అందువలన గూడ గర్భాశయము మడుచుకొని పోగలదు. గర్భాశయముపై పెట్టబడినరుమాలు మడతను మరునాడు తీసివేయవచ్చును గాని పొత్తికడుపు కట్టును మాత్రము

బాలింతరాలు మంచము మీదనుండి లేవగలుగువరకును తీయగూడదు. పొత్తికడుపుకు కట్టుకట్టి సరిచేసిన పిమ్మట బాలింతరాలి ప్రక్కమీద నుండి మాసిన గడ్డలనున్నిటిని తీసివేయవలెను. ఒకపైంటు వేడినీళ్లలో ఒక టీ స్పూను లిసలు ద్రావకమును కలిపి ఆ నీళ్లలో ఆ గడ్డలను నుంచి వుతికి ఆరవేయవలెను. ప్రక్కను శుభ్రపఱచి తాబాకువాలు (సానిటరీ టవెలు) ను పరువవలెను. 90 నిమిషముల వరకును బాలింతరాలు కదల కుండ పరుండవలెను. నిద్రపట్టినచో మెలే. పట్టుకున్నను కదలకుండ పరుండియుండవలెను. బాలింతరాలుప్రసవముకాగానే లేచి కూర్చున్నచో విధిగా రక్తస్రావము కలుగును గాన, అటుల వెన్నడును కూర్చుండ గూడదు. ఇది చాల ముఖ్యతరమని తెలుసుకొనవలెను. రక్తస్రావము కలు గుటకుగల తక్కిన కారణము లన్నిటిలోను యిదియే ముఖ్యతరము. ప్రసవ సమయమున బాలింతరాలికి అలసట చాల మెండైనచో శిశువు కలిగిన పిమ్మట నామె మిగుల సోలిపోయి యుండిన యడతను, రక్త స్రావము కలుగక పోయిన యడతను, టీనిగాని, కాఫీనిగాని, డికాక్ష్ ను విస్తారముగా వేసి త్రాగించ వలెనుగాని, దానిని గోరువెచ్చగా చల్లార నిచ్చి త్రాగవలెను గాని, మిక్కిలి వేడిగా త్రాగగూడదు. అటుల త్రాగించిన చాల ఉత్సాహము కలుగును. రక్తస్రావము కలిగినచో పాలలో మంచగడ్డవేసి ఆ పాలను త్రాగించ వలెను. ఇటులగంట

న్నరసేపునకు తక్కువగాకుండ బాలింతరాలు విక్రమించిన పిమ్మట గుహ్యంగములను మరల కడిగి పొడిగానుండు తాజా చేతిరుమాలును వాని పైని కప్పవలెను. సాధారణముగా నప్పటికి కొంతరక్తస్రావముగాని, రక్తపు తునకలుగాని కనబడును. కావున యీ రీతిగా 4-5 రోజుల వరకును ఆ భాగములను ప్రతిదినమును చాలసారులు పరిశుభ్రముగా కడుగుచునే యుండవలెను. పెద్దపురుడు పదిరోజులలోను బాలింతరాలికి యెట్టిఉద్రేకమును కలుగగూడదు. చాలమంది ఆమెను చూడ వచ్చినచో విధిగా వృద్ధేకము కలుగును. గాన పురిటి గదిలోనికి యెవ్వరిని రానియ్య గూడదు. ముఖ్యముగా అంటువ్యాధులు బాలింతరాండ్రకు సులభముగా సోకును గాన, యెవరువచ్చినచో వారిద్వారా అంటువ్యాధులు సోకునో, అట్టివారిని పురిటిగదిలోని కెంతమాత్రమును రానియగూడదు.

ప్రసవమైన పిమ్మట ఆరుగంటలలోగా బాలింతరాలు మూత్రమును విడువవలెను. ఒక ప్రక్కకు వంగకుండనే మూత్రవిసర్జనము చేయుట మంచిది. లేదా, అనగా, ఆమె అటుల మూత్రమును వదలజాలనిచో బొర్లగిలపడి మోకాళ్లమీదను, చేతులమీదను ఆనుకొని మూత్రమును వదలవలెను. అప్పటికిని మూత్రము సరిగా పోనిచో వైద్యులను పిలువవలెను. ఈ లోగా పొత్తికడుపు దిగువభాగము పైనను, గుహ్యంగము పైనను వేడినీళ్లతో కాపటము పెట్టవలెను.

ప్రసవమైనపిమ్మట సరిగా విరేచనమగుచుండుట చాలముఖ్యము. మరునాడు సాయంత్రమునగాని, మూడవనాడుదయమున గాని విరేచనము కాకపోయినచో, ఒక టేబిలుస్పాను ఆముదమును త్రాగించవలెను. లేదా వెచ్చనినీళ్లలో సబ్బుకలిపి యెనీమా చెయ్యవలెను.

ఆహారము:—బాలింతరాలు మంచి ఆరోగ్యవతిగా నున్నచో చనుబాల జ్వరము తగ్గిపోవువరకును పాలు, టోస్టు, బాల్లీ పాలు కలిపిన పలచని జావ, లేక ఆరోరూటు పాలు కలసిన పలచని జావ, అంబలి (గూయెలు) మున్నగువానిని మాత్రమే పుచ్చుకొను చుండవలెను. అటుపిమ్మట బాలింతరాలి అభిప్రాయానుసారము ఆహారమును యేర్పాటు చేయవచ్చును. మూడురోజులు వెళ్ళిన పిమ్మట మరే జబ్బును లేనిచో, మజ్జిగ అన్నము, చారు అన్నము, పాలు అన్నము, మంచి మాంసము లేక కోడిపిల్ల మాంసముతో చేయబడిన పులుసు మున్నగు వానిని తినవచ్చును. మూడు రోజులు గడచిన పిమ్మట గూడ కరకర ఆకలి వేయనిచో, వైద్యులను పిలువవలెను. ఏదో లోపమున్నదని గ్రహింప వలెను.

ప్రసవమైన పిమ్మట ఒక అరగంటకు సాధారణముగా లోకియా లేక క్లీనింగ్సు అనబడు నొక విధమగు కల్మష స్రావము

కలుగును. నానితో పాటు కొద్దిగా నొప్పలు (ఆప్టరు-పెయిన్సు) గూడ నుండును. ఆపుడు రక్తస్రావ మధికమగును. ఆహారము తినుట, మూత్ర విసర్జనము మున్నగు పనులకు లేచినపుడెల్ల నల్లని రక్తపు గడ్డలు పడిపోవుచుండును. ఈ నొప్పలు మితముగా నున్నచో, చాల మంచిదే. అవిరక్త స్రావమును నిరోధించును. గర్భాశయములోని మలినమును వెడల నడచును. అది ముడుచు కొనునట్లు గూడ చేయును. తరుచుగా శిశువుకు పాలిచ్చుచుండుట వలన గూడ యీ నొప్పలు అధికమగుచుండును. ఈ నొప్పలు సామాన్యముగా నున్నచో యే మందును అవసరము లేదు. మిక్కిలి హెచ్చుగా నున్న యడల మాత్రము వైద్యుని పిలువవలెను. మొదట నీ రక్తము యెర్రగానే రక్తపు ముద్దలతో కలసి యుండును గాని క్రమముగా నది చాల పలచబడి పసురంగుతో కలిసిన పసుపు రంగుగా మారును. చివరకు మురికి నీళ్లవలెనగును. ఆనీళ్ల కొకవిధమగు వాసనగూడ నుండును. ఆ నీటి పరిమితియును, కాల పరిమితియును, బాలింతరాండ్ర ప్రకృతిని బట్టి అనేక విధములుగా నుండును. కొందరికి మావిపడిపోగానే యీ నొప్పలు తగ్గిపోవును. మరికొందరికి నెల రోజుల వరకును గూడ తగ్గవు. బాలింతరాలు నీరసస్థితిలో నుండినచో యీ నొప్పలు చాల కాలముండును గాన, అధికమగు జోగ్రత్త పుచ్చుకొన వలసి యుండును.

అట్టిచో విధిగా డాక్టరును పిలువవలెను. లేనిచో ఆవల చాల చిక్కుల కలుగ గలవు.

సాధారణముగా ప్రసవమైన పిమ్మట 12 గంటల వరకును బాలింతరాలి పాలిండ్లు సామాన్యముగానే యుండును. గాని వానిలో నొప్పి కలుగును. అవి పెరుగ సాగును. వానిలో నుండు పాలకు బిగువు చాల అధికమగును. అందువలన స్తనముల భారముగూడ నధికమగును. రక్తము పాల క్రింద మారుటకు పాలిండ్లలోనికి యెంత వడిగా ప్రవహించుచుండునో, యీ మార్పుగూడ అంత అధిక ముగనే కలుగుచుండును. కొంత మందికి వణుకు కలుగును. కొందరికి కొద్దిగా జ్వరము గూడ తగులవచ్చును. పాలు స్రవింప నారంభింపగానే యివన్నియును తగ్గిపోవును. వణుకు పుట్టినచో వైద్యుని పిలువవలెను. ఈజోగా విరేచన మగుట కొక మోతాదు యియ్య దగును. స్తనముల మీద కాపటము పెట్టదగును. బాలింతరాలికి రక్తస్రావము కలుగుటయును, దానిని నివారించుటకును గర్భాశయము ముడుచుకొనునట్లు చేయుటకును, పైని సూచింపబడిన రీతిని శిశువును తల్లి ప్రక్కలో పరుండబెట్టి తల్లికొమ్మ ను శిశువునోటిలో పెట్టుటయును జరిగినయడల తప్ప లేనిచో ప్రసవ మైనపిమ్మట అరుగంటలగువరకును శిశువునోట తల్లి స్తనాగ్రమును పెట్టు

గూడదు. ఒకటి రెండు కాన్నులైన వారికి త్వరలోనే పాలు విస్తారముగా మారును. కొంతమంది శిశువులు, పుట్టిన వెంటనే నిద్ర పోక పోరు పెట్టెదరు. అట్లు పోరు పెట్టినను, పాలు విస్తారముగా వెంటనే యూరినను ఆరు గంటలగు వరకును ఆగ నక్కరలేదు. వెంటనే శిశువు నకు స్తన్యము నియ్యదగును. చను మొనలు మిక్కిలి పొట్టిగానున్నను సరిగా నేర్పడక పోయినను చనులు మిక్కిలి హెచ్చుగా పెరుగుటచే చను మొనలు శిశువు నోటి కందకుండ నున్నను చనుగొట్టము (బ్రెస్టు పంపు) తో చను మొనలను పైకి లాగవలెను. చనుగొట్టము లభింప నపుడు సోడా బుడ్డిని తెచ్చి అడుగు బిళ్లను మాత్రము జాగ్రత్తగా తీసి వేసి సోడా బుడ్డి మూతని అనగా సన్నగానుండు భాగమును చను మొనకు తగిలించి సోడా బుడ్డి అడుగు భాగమును నోట బెట్టుకొని పీల్చినచో చనుబాలు ఆ బుడ్డి గుండా నోటిలోనికి వచ్చును. మొదట వచ్చు ధారలు నీళ్ల వలెనేయుండును గాని వానిలో పసుపురంగుగా ధారములవలె సన్నగా నుండును. ఈ మొదటి ధారలు శిశువుత్రాగినచో శిశువునకు విరేచనమగును. విరేచనము చేయించు శక్తి కోల్పోప్రతిము అనబడు యీ మొదటి ధారలకు కలదు. 24 గంటలైన పిమ్మట చను బాలుకెల్లగా మారును. వానికి తీపి కలుగును. అవి చిక్క బడును (ఒకేకు).

శిశువుకు పాలియ్యబోవునపుడును, శిశువు పాలు త్రాగినపిమ్మటను మెత్తని గుడ్డను నీళ్లలో ముంచి ఆ గుడ్డతో చనుమొనలను శుభ్రముగా తుడుచుచుండవలెను. చనుబాలు ఒక్క చుక్కయైన చనుమొనల కంటుకొని అచట యెండిపోయినచో అచట దురద, మంట, పుండు మున్నగునవి కలుగును. శిశువు మరల చనుగుడుచునపుడు ఆయెండిన పాలు శిశువు కడుపులోనికి పోయి చాల బాధ కలిగించును గాన, శిశువు పాలు త్రాగిన వెంటనే మెత్తని తడిగుడ్డతో స్తనములను, స్తనాగ్రములను బాగుగా తుడువవలెను. మరల పాలియ్య బోవునపుడు గూడ నిటులే చేయుచుండవలెను. ప్రతి దినమును ఉదయమునను, సాయంత్రమును, స్తనములకును, స్తనాగ్రములకును సబ్బురాలి వేడినీళ్లతో కడుగుచుండవలెను. ఈ రీతిగా శ్రద్ధగా చేయుచున్నచో చనుల యొద్ద పుండ్లు, యితర బాధలు మున్నగున వేవియును కలుగవు. మొదటి వారమున బాలింతరాలు పరుండియే చనుగుడుపుచుండవలెను. ఆ మొదటి ఒక ప్రక్కకు వత్తిగిలి మోచేతిమీద నానుకొని చనుమొనను శిశువు నోట పెట్టవలెను. అటు పిమ్మట జేర్లబడి కూర్చుండి శిశువుకు పాలియ్యవలెను. రెండు చను మొనలను మార్చి మార్చి శిశువు నోట పెట్టుచుండవలెను.

12 వ రోజునకును తల్లి పరుండియే యుండవలెను. పిమ్మట పడక కుర్చీలోగాని కవాచీ మంచములోగాని జేర్లబడి కూర్చుండ వచ్చును. పరుపుమీద ఒక ప్రక్కనుండి మరియొక ప్రక్కకు బాలింతరాలిని త్రిప్ప వచ్చును. లేదా ఒక మంచముమీదనుండి మరియొక మంచము మీదికి ఆమె నుమార్చవచ్చును. ప్రక్కను దులిపి వేయుటకు గూడ బాలింతరాలిని లేవదీసి కూర్చుండ బెట్టగూడదు. అందులో రక్తస్రావము విస్తారముగా మున్నచో అసలే కదలింపగూడదు. గర్భాశయము మరల మామూలు స్థితికి వచ్చుటకు కొంతకాలము పట్టును. త్వరగా అనగా 12 రోజులలో పూనే ప్రక్క మీదనుండి లేచినచో దాని ఫలితముగా, నీరసము, నొప్పలు, విరామము లేని రక్తస్రావము మున్నగునవి కలుగును. తొందర పడి యింటి పనులు చేయుట, భోగముల ననుభవించుట మున్నగు పనులను బాలింతరాలు చేసినచో గర్భాశయము యెల్లప్పుడును వాచియుండుట, లేక స్నానమునుండి తొలగుట మున్నగు అనర్థములు కలుగుటకు దారి యేర్పడును. ప్రక్క మీదనుండి లేచినందు వలన రక్తస్రావము కలిగినచో పొరబాటును గ్రహించి మరల వెంటనే పరుండవలెను. ప్రసవ వేదన ప్రారంభమైనది మొదలుకొని పురిటి గది లోనికి గాలి బాగుగా వచ్చుచుండునట్లు మంచి యేర్పాటులను చేయవలెను. భారతీయులలో చాలమంది యీ విషయమున నేమియును

శ్రద్ధ పుచ్చుకొనరు. సాధారణముగా చాలమంది, గాలి రావీలులేని గదులనే ప్రసవమునకు యేర్పాటుచేసి నెల పురుడు వెళ్లు వరకును బాలింతరాలిని, శిశువును, గాలి రావీలులేని ఆ చికటి గదిలోనే యుంచెదరు. గాలి తగిలినచో బాలింతరాలికిని, శిశువుకును జలుబు చేయునని వారు దురభిప్రాయపడుచుందురు. ఇది మిక్కిలి పొరబాటు. బాలింతరాలికిని, శిశువుకును గూడ మంచి గాలి ముఖ్యావసరమైయున్నది.



తొమ్మిదవ ప్రకరణము.

అసహజ వ్రసవ వేదన.

నొప్పి లారంభమైన 24 గంటలలో శిశువు జనించిన యెడలను, ఆవుడు, మొదట, శిశువు తలయే బయటకు వచ్చిన యెడలను అది సహజ మగుకానుపగును. దీనికి భిన్నములగున వన్నియును అసహజములే.


(౧) చాలనేపు నొప్పులుపడుట.

మిక్కిలి హెచ్చు కాలము వరకును గర్భవతి నొప్పిలు పడుచు న్నను బిడ్డ పుట్టకపోవుట నిరపాయకరము కాదు, గాన నది దీర్ఘ కాలపు కానుపని మా అభిప్రాయము. ప్రసవములో గల అపాయ లక్షణము లీ దిగువ వివరింపబడెను. గాన, వానిని గమనించి వెంటనే వైద్య సహాయ మును బడయవలెను.

(అ) నాడివడి 70-80 మధ్యగా నుండినచో అది సహజము. నాడివడి 100 గాని నూటికి పైగాగాని యున్న యెడలను, చాలనేపటి వరకును శిశువు కలుగని యెడలను వెంటనే వైద్యుని పిలువనంపవలెను.

(ఆ) ఒక నొప్పికిని, రెండవ నొప్పికిని మధ్య విరామము లేక పోయినను. నొప్పి వచ్చినపుడు బాధ భరింపనలవి గాకుండ నుండినను, కొంతసేపు నొప్పిలు వచ్చి తరువాత పూర్తిగా నిలచిపోయినను (సాధారణముగా నీటితిత్తి పగిలినపిమ్మట నటులనాగి పోవును) వెంటనే వైద్యుని పిలువవలెను.

(ఇ) గర్భవతి మొగమున ఆందోళనము కనబడు చుండినను, ఆమె నాలుకపై తడిలేక పోయినను, నాలుకపై పొచి యేర్పడినను వెంటనే డాక్టరును పిలువవలెను.



1. పుర్రె (వెల్టాక్సు)

2. మొగము.



3. వస్తికము (పెల్విసు).

4. అడ్డము (ట్రాన్స్ వెర్సు).

5. కనుబొమ.

శిశువులు జనించు ముఖ్యరీతులై
దిచట చూప బడినవి.

(2) బొడ్డు నరము బిడ్డ మెడకు చుట్టుకొనుట.

12 మందిలో నొకరి కిటుల జరుగు చుండును. బొడ్డునరము బిడ్డమెడకు తగులు కొనినపుడది చాల పొడుగుగానే యుండును గాన సాధారణముగా నిది ప్రమాదకరము కాదు. అప్పుడు దానిని మెల్లగా లాగి వదులు చేయవలెను. ఆ సందులలో శిశువు భుజములను మార్చ వలెను. నరము పెద్దదిగానున్నచో దానిని శిశువు తలమీద నుండి తీసివేయ వలెను. కొంతమందికి నరము చాల బిగువుగానుండును. అప్పుడది శిశువు మెడకు బిగుసుకొని పోయినచో డిఫ్ఫిరాడక శిశువుమరణించును గాన నపుడు నరమును తెంపవలసి యుండును. అప్పుడు దానిని కత్తితో కోసినచో రక్తమధికముగా ప్రవించును గాన కత్తితో కోయగూడదు. చేతి వ్రేలి గోరుతోనే తెంపవలెను.

(3) పిరుదులు ముందు వచ్చుట

అరువది మందిలో నొకరికిట్టి కాసుపుకలుగును. అప్పుడు శిశువు పిరుదులయొద్ద మడతపడును గాన, శిశువుకు విశాలమగు స్థలము కావలసి వచ్చును. అందువలన చాల సేపటి వరకును ప్రసవము జరుగదు. ఇటుల జరిగినచో మరల శిశువు తలను క్రిందకు తిప్పుట చాల కష్టము

గాన, వెంటనే వైద్యుని పిలువవలెను. ఈ లోగా గర్భవతి పరుండియే యుండవలెను. నీటి తిత్తి పగులువరకును చూలంతరాలు ముక్కు గూడదు. వైద్యులు సమీపమున లేని యెడల, శిశువు, బొడ్డువరకు వెలు పలికిరాగానే బొడ్డునరములో నొకమడతను లాగి దానిని వస్తికము నందొక ప్రక్కకు మరలించ వలెను. అచటనది తలమీద విశేషముగ నొక్కుట కవకాశము తక్కువగానుండును. పిమ్మట బొటనవ్రేలిని మరి యొక వ్రేలిని ఆ నరముమీద నుంచవలెను. గాని దానిలోని ధ్వని చేతికి తగులుచున్నంత సేపును యేమియును చేయగూడదు. భుజములు వెలుపలకు వచ్చువరకును వేచియుండవలెను. చాలమంది కప్పుడు మరియొక నొప్పితోనే శిశువు పూర్తిగా క్రిందపడును. లేదా చాల వరకైన వెలుపలకు వచ్చును. బొడ్డు నరము ధ్వని తగులు చున్నంత వరకును శిశువు భుజములు వెలుపలికి వచ్చిననే గాని శిశువును లాగ గూడదు. ఇది చాల ముఖ్యవిషయము. అటుల లాగినచో శిశువు చేతులు తలపైని తగులుకొనును. అప్పుడు శిశువు జనించుట మరింత కష్టమగును. బొడ్డునరము ధ్వని చేతికి తగులకుండ నిలచిపోయి నపుడు మాత్రము వెంటనే శిశువును పైకి లాగివేయవలెను. లేనిచో శిశువు లోపలనే చనిపోవును.

(౪) చేతులు ముందువచ్చుట (కానుబర్తు)

230 మందిలో నెవరికో యొకరి కిట్టి కానుపు కలుగును.



దీనినే అడ్డకాను పండును.
ఒకచేయి ముందుగా
వెలుపలికి వచ్చుటయని
గూడ దీనినందురు,

ఇటుల జరిగినచో వైద్య సహాయము
ముఖ్యముగా నుండవలెను. లేనిచో
శిశువు పుట్టనేరదు. డాక్టరు వచ్చు
వరకును శిశువుతల యేత్తట్టున తగులు
చుండునో, ఆ తట్టుగా గర్భవతి పరుండి
యుండవలెను. శిశువు తలను సరిగా
త్రిప్పటకు డాక్టరు శస్త్ర చికిత్సను
(ఆపరేషను) చేయవలసిన అవసరము
గూడ కొందరికి కలుగవచ్చును,

(గీ) కవల పిల్లలు.

70 మందిలో నొకరికి కవల పిల్లలు పుట్టెదరు. కొంతమందికి
శిశువు తలయును, మరికొందరికి శిశువు కాలును వెలికి వచ్చును. సాధా

రణముగా కవల పిల్లల ప్రసవము సహజముగానే జరుగుచుండును.
మొదట నొక శిశువు జనించునుగాని కొందరికి వెంటనే దాని మావి



కవల పిల్లలు (గలాచిన)

పడిపోదు. గెండవ శిశువుగూడ పుట్టిన
పిమ్మటనే మావి పడును. కొందరికి
మొదటి శిశువు పుట్టినవెంటనే మావి
పడిపోవుటయును కలదు. గర్భాశయ
పరిమాణము కొద్దిగా తగ్గుటవలన గెండవ
శిశువులోన నున్నదని గ్రహింపవచ్చును.
ఒక వేళ మొదటి శిశువు పుట్టగానే
మావి పడనిచో దానిని తీయుటకు
ప్రయత్నింపగూడదు. ఏలననగా యిద్దరు
శిశువులు కలిగినను కొందరికి మావి

యొక్కటియే పడునుగాని గెండు పడవు. కవల పిల్లలున్నారను అను
మానము కలిగినచో డాక్టరుకు వెంటనే తెలియజేయవలెను. మొదటి
శిశువు కలిగిన పిమ్మట డాక్టరు వచ్చులోగా గర్భాశయము ముడుచు
కొని పోవుటకు ప్రయత్నింప వలెను. పేగుల అడుగుభాగమును
అయిదు వ్రేళ్లతోను గట్టిగా పట్టుకొన వలెను. కొందరికి మొదటి

శిశువు కలిగిన పది నిమిషములలోనే రెండవ శిశువు కలుగును. మరి కొందరికి కొన్నిగంటల వరకును కూడ కలుగదు. అప్పుడు మరల నొప్పలు కలుగువరకును బాలింతరాలు పరుండియే యుండవలెను. రక్తము స్రవించకుండా చూచుకొనుచుండ వలెను. మొదటిశిశువు కలుగునపుడే ఆవయవములన్నియును విడిపోవును గాన రెండవ శిశువు కలుగుట కంత కష్టముండదు. మొదటి శిశువు కలుగగానే బొడ్డునరమును, రెండుచోట్ల ముడిపేయవలెను గాని, మావిని మాత్రము తీసివేయ గూడదు. రెండవ శిశువు కలిగిన పిమ్మటను, మావి పడి పోయిన తరువాతను గర్భశయము ముడుచుకొనుటకు తగిన జాగ్రత్త పుచ్చుకొన వలెను. గర్భశయము గట్టిగానుండు బంతివలె స్థిరముగా చేతికి తగులు వరకును చేతితో గర్భశయము నదునువలెను. దానిపైని కట్టుకట్టవలెను.

(౬) శిశువు కాలు ముందు వచ్చుట.

కొందరికి శిశువు కాళ్లలో ఒకటిగాని, రెండునుగాని ముందుగా యీవలకు వచ్చును. ఇది 100 మందిలో నొకరికి మాత్రమే జరుగుచుండును. ఈ కానుపు వలన తల్లికి నిరపాయమే. గాని శిశువుకు నిరపాయము కాదు. ఒత్తిడి వలన బొడ్డు నరమునందలి రక్త చలన మాగి

పోవుట కవకాశము కలదు. వెంటనే వైద్య సహాయ మత్యవస



కాలు ముందు వచ్చుట.

రము. అంతవరకును బాలింతరాలేమియును చేయగూడదు. నొప్పలు వచ్చుచునే యుండవలెను. కాళ్ళు ముందు వచ్చిన యడల పిరుదులను నిలిపియుంచ వలెను. పిరుదులనెంత నేపు నిలుప గలిగిన నంత మంచిది. అందువలన నా భాగములంత విశాల మగును. అప్పుడు తల వెలుపలికి వచ్చుట చాల సులువగును. పిరుదు లేవ లికి రాగానే నాభి నరమును పరీక్షించి చూడవలెను. దాని చలన మాగిపోయినచో మరియొక నొప్పితో శిశువు క్రింద బడునట్లు తొందరగా ప్రయత్నము చేయవలెను. మరల నొప్పి రాగానే పిల్లను నిదానముగ క్రిందికి లాగవలెను. తల యీవలకు వచ్చిన పిమ్మట గూడ నాభినరము కొట్టుకొనుచునేయున్న ఎడల పిల్ల యేడ్చు వరకును దానిని విడదీయగూడదు. నాభినరములో రక్త చలన మున్న యడల చనిపోయిన బిడ్డ ప్రసవమునకు తెలుపబడిన పద్ధతినే ఆవలంబింప వలెను.

(2) ముఖము ముందు వచ్చుట.

230 మందిలో నొకరికి శిశువు ముఖము మొదట వెలుపలకు వచ్చును. శిశువు తల పైభాగము మొదట వెలుపలకు వచ్చుటకు మారుగా కొందరికి శిశువు ముఖము వెలుపలకు వచ్చును. ఇటుల జరిగినచో చాల సేపు కష్టపడిన గాని శిశువు కలుగదు. ఇట్టి కానుపులో శిశువు తల యును, మొగమును వాచి వక్రతను జెందును గాని, సాధారణముగా శిశువుకు ప్రాణాపాయము కలుగదు. వెంటనే వైద్యుని పిలువవలెను. డాక్టరు వచ్చువరకును గర్భవతి మొదటి నొప్పల కాలములో లేచి నడువగూడదు. విధిగా పరుండియే యుండవలెను. నీటి తిత్తి త్వరగా పగులకుండుటకు శక్తి వంచన లేకుండ ప్రయత్నించు చుండవలెను. వైద్యులు సమీపమునందు లేనిచో సహజముగా ప్రసవము జరుగు వరకును మిన్నక చూచుచుండుటయే కర్తవ్యము. అదియే ఉత్తమ పద్ధతి.

(౮) నొసలు ముందుగా వెలుపలికి వచ్చుట.

శిశువు నొసలు మొదట వెలుపలికి వచ్చినచో శిశువు సహజముగా పుట్టజాలదు గాన, వీలైనచో శిశువును సరియైన రీతికి తిప్పుటకు

ప్రయత్నింపవలెను. లేనిచో శిశువుకు ప్రాణాపాయము కలుగ వచ్చును. వెంటనే వైద్యుని పిలువనంపవలెను గాని మరేమియును చేయగూడదు.



పదవ ప్రకరణము.

ప్రసవ సమయమున పరిశుభ్రత.

గర్భవతి ఆరోగ్యవతిగా నున్నచో నొప్పలు ఆరంభించగానే యోని మార్గమునందు ద్రవ మధికముగా నూరును. గర్భాశయద్వారమునందలి గోళములలోనూరిన ద్రవము కొంతయును, యోనియందలి రక్త నాళములనుండి వెడలిన పలచని ద్రవము కొంతయును యోని ద్వారమునందు కలియును. ఈ ద్రవమునందు రక్షక క్రిములు విస్తారముగా నుండును గాన, హానికరములగు వ్యాధులను కలిగించు క్రిములు గర్భాశయమునందు ప్రవేశింపకుండ నీ రక్షక క్రిములు వాని నిరోధించుచుండును. ఈ రక్షక క్రిములు అట్లు తీరరసమును (లాక్టియూసిడు) ను గూడ కలిగించును. ఈ రసము యోని లోని ద్రవమును పసరు (యాసిడు) గా మార్పును. ప్రసవమైన పిమ్మట జ్వరమును కలిగించునట్టి క్రిములు యీ యాసిడులో పెరుగ జాలవు గాన, నవి భగద్రవమునందు జనింప జాలవు. యోనిలో ప్రాణవాయువు (ఆక్సిజను) లేదు గాన రక్షక క్రిముల, క్రిమి సంహారక శక్తి మరింత అధికమగు చున్నది. రోగములను కలిగించు ననేక రకములగు క్రిము

లకు యోనిలో ప్రవేశ పెట్టినను నవి కొన్ని గంటలలోనే చనిపోవు నని గూడ పరిశోధనల వలన స్పష్టమైనది. యోనియందు సహజమగు నిట్టి రక్షణ యుండుటయే గాక గర్భాశయ ద్వారమునందంతటను జిగట (మ్యూకసు) తో నిండి బిరడావలె బిగిసి యుండుట వలనగూడ విష క్రిములు లోనికి పోజాలవు.

శిశువు జనింపగానే లోపలనుండు ఉల్లి పొరవంటి చర్మపు గోడ (మెంబ్రేన్స్) లన్నియును పగిలిపోవును గాన బిడ్డ చుట్టునుండు సంచిలోని నీరు లిక్కరు అమ్మి అను యోనిలోనికి వచ్చును. అపుడచటనుండి రక్షక క్రిములన్నియును వెడలి పోవును. ప్రసవ సమయమున గర్భాశయము చాల ప్రమాదములకు గురియైయుండును గాన అట్టి అపాయ స్థితిలో విషక్రిములు దానిలో ప్రవేశింపకుండ చేయుటకు ప్రకృతి యీ యేర్పాటుల నన్నిటిని చేసియున్నది. యోని పరీక్షను, యోనిలో శస్త్ర చికిత్సను చేయవలసి వచ్చినపుడు సహజమగు నీ రక్షణ చాలదు గాన, హాని కరములగు క్రిములు గర్భాశయమున ప్రవేశింపకుండుటకు మనము శక్తి వంచన లేకుండ రక్షణ ఏర్పాటు చేయవలసియుండును. వైద్యుల చేతులు మురికిగానుండినను, శస్త్రోపకరణములు మురికిగా నుండినను మరియొక శ్రీకి శస్త్ర చికిత్స చేసినపుడు

యోనియందలి విషద్రవ్యము వైద్యుని చేతులకు గాని, ఉపకరణములకు గాని అంటుకొని యుండినను వ్యాధిని కలిగించు విషక్రిములా రీతిగా గర్భవతి యోనియందు ప్రవేశించుట కవకాశము కలదు.

అందు వలన వైద్యులు చేతులను శుభ్రముగా కడుగుకొనవలెను. గోళ్లలో తరుచుగా మురికి చేరును. మురికిలో విషక్రిములందును. గాన గోళ్లను తీయించుచుండవలెను. చేతులను నుంచి కార్బాలికు సబ్బుతో కడుగవలెను. కుంచెతో గోళ్లను శుభ్ర పరచవలెను. పిమ్మట సబ్బంత యును పోవునట్లు నీళ్లతో చేతులను బాగుగా కడుగవలెను. అనంతరము నీళ్లలో పుటము వేయబడినట్టియు, త్నయింపజేయునట్టి స్వభావము కలిగినట్టియు (కరోసివు సబ్బిమెటు) పదార్థమును 500 కు 1 వంతున కలిపి చేతులను 1-2 నిమిషముల వరకును ఆ నీళ్లలో మంచి యుంచవలెను. ఏ విధమైన చమురును వాడగూడదు. ఆముదమును బొత్తిగా వాడగూడదు. కార్బోలిషుడు వాసిలెనుగూడ హానికరమే. శస్త్రము చేయవలసిన అవసరము కలిగినచో ఉపకరణములను అయిదు నిమిషములకు తక్కువ కాకుండా నీళ్లలో వేసి మరిగించవలెను. యోనియును, దాని చుట్టునుండు చర్మమును వంగకుండుటకు 1000 కి 1 వంతున గల కరోసివు లోషనుతో గాని, ఒక పైంటు నీటిలో 1 టీ స్పూను

వంతున గల లిసలు లోషనుతో గాని (వేడి నీళ్లు—చల్లని నీళ్లు) యోనిని, దాని చుట్టునుండు చర్మమును కడుగవలెను. ప్రసవమునకు ముందును, ప్రసవమైన పిమ్మటను యోని మార్గమునందు పిచికారీ (డొచింగు) చేయు పద్ధతి యిప్పుడు మానివేయబడెను. ఈ రీతిగా తగిన యేర్పాటు లన్నియును చేసినచో ప్రసవమైన పిమ్మట నూతికా జ్వరము (స్ట్రెప్టోకోక్కివరు) బాలింతరాలికి తగులుటకు వీలండదు. మంత్రసాని తనమా నందధిక ప్రజ్ఞగల వారైనను నూతికా జ్వరము రాకుండుటకు తగిన యేర్పాటులను చేయనిచో బాలింతరాండ్ర ప్రాణములను కాపాడజాలరు. ఈ జ్వరము రాకుండుటకు పైని వివరించిన యేర్పాటులను చేసినచో బాలింతరాండ్రలో మరణములు చాల తక్కువ యగును.

ప్రసవమునందు ఉద్యతములు.

(౧) రక్తస్రావము.

శిశువు పుట్టకముందును, పుట్టిన పిమ్మటను, శిశువు పుట్టిన పిమ్మట మిగిలిన పడకముందునుగూడ బాలింతరాలికి రక్తస్రావము కలుగవచ్చును. శిశువు పుట్టకముందే కలిగినచో, మిగిలిన గర్భాశయద్వారము మీద పడు

తుడే సాధారణముగా రక్తస్రావమునకు కారణముగును. అటుల పడినచో గర్భాశయము విస్తరించినపుడు మావిలోని నాళములు పగిలిపోవును. ఈ రీతియగు రక్తస్రావము గర్భవతికి ఆరు నెలలు నిండిన పిమ్మట నెప్పుడైనను కలుగవచ్చును కాని సాధారణముగా 8-9 నెలల ముఖ్య చాల మందికి కలుగుచుండును. అటుల కలిగినచో చూలంతరాలు కదలగూడదు. ఆమెను పరుండబెట్టి వైద్యుని పిలువవలెను. ఈ లోగా చూలంతరాలికి టీ, కాఫీ, సారా మున్నగు ఉద్రేక కరములగు వాని నియ్యగూడదు. గుహ్యంగము పైని తడిగుడ్డ పట్టిలను వేయవలెను. ఆహారమును చాల కొద్దిగా నియ్యవలెను.

ప్రసవమైన వెంటనే గాని మావిపడిన పిమ్మట గాని, కొన్ని గంటలైన పిమ్మటను గాని రక్తస్రావము కలుగవచ్చును, కొన్ని రోజులైన పిమ్మట గూడ కొందరికి కలుగును. ప్రసవము కాగానే రక్తస్రావము కలిగినచో గర్భాశయము బాగుగా ముడుచు కొనక పోవుటయే కారణముగును. మావి పడిపోయిన పిమ్మట సామాన్యముగా నందరికిని గూడ కొంత రక్తస్రావము కలుగును. అది 8-10 అవున్నులకంటె హెచ్చుగా నుండదు. అంతకంటె అధికముగా రక్తము పోయినచో బాలింతరాలికి స్పృతి తప్పిపోవును. పాలిపోవును. ఊపిరి గూడ సరిగా

అందదు. అప్పుడు గర్భాశయము మెత్తగానుండును. అది ముడుచు కొనునట్లు చేయుటకు పేగుల అడుగు భాగమున చాల గట్టిగా నొక్కివలెను. గర్భాశయము పైని చెయివేసి చర్మము గుండ దానిపైని చేతితో రాయవలెను. చేతితో దానిని గట్టిగా పట్టు కొనవలెను. మిక్కిలి చల్లగానుండు నీళ్లలోగాని, మంచుగడ్డవేసిన నీళ్లలోగాని, చిన్న తుపాలు ముంచి ఆ భాగములపైని వేయవలెను. చల్లని నీళ్లను గాని మంచుగడ్డవేసిన నీళ్లను గాని త్రాగించవలెను. శిశువు నోట తల్లి పాలిండ్లను పెట్టువలెను. ఉద్రేక కరములగు పానీయములను త్రాగగూడదు. బాలింతరాలిని లేవదీసి కూర్చుండ బెట్టు గూడదు.

శిశువు పుట్టిన పిమ్మటను, మావి పడకముందును రక్తస్రావము కలిగినచో గర్భాశయము పైని నొక్కుట వలన గాని, యోనిలోనుండి గర్భాశయము లోనికి చేతిని పోనిచ్చి గాని వ్రేళ్లతో మావిని చీల్చి తీసివేయవలెను. అనగా డాక్టరును పిలిచి డాక్టరుచేత నిటుల మావిని తీయించవలెను గాని యితరులు తీయగూడదు. డాక్టరు లేనిచో మరియొకరు చేతిని పొడిగుడ్డతో తుడుచుకొని దానికి తీయించరు అఫ్ అయోడినును రాయవలెను. లేనిచో రక్తము విష మితమై అసాయము కలుగగలదు.

ప్రసవమైన పిమ్మట కొన్ని గంటలలో, కొన్ని రోజులలో గడచిన యనంతరము రక్తస్రావము కలిగినచో అది అనేక కారణముల వలన కలుగును. మావిలో కొంత భాగము నిలువయుండుట, రక్తపు ముద్ద అడ్డుపడుట వలన గర్భాశయము పూర్తిగా ముడుచుకొనక పోవుట, గర్భాశయము విడిపోవుట, భయము, ఉద్రేకము మున్నగు కారణములలో దేనివలననైనను రక్తస్రావము కలుగును. అప్పుడు బాలింతరాలు పరుండి యే యుండవలెను. గర్భాశయము, యోని మున్నగు నవయవములపైని దళసరి గుడ్డను చన్నిళ్లలోతడిపి కప్పవలెను. డాక్టరును పిలువనంప వలెను. రక్తస్రావము కలిగిన వారికి ఎగ్గాటు లిక్కిడు ఎకస్త్రాక్టును ఒక మోతాదుకు ఒక డ్రాము వంతున నియ్యవలెను. ఇదియే దీనికి మిక్కిలి మంచి మందు.

ఈ సాధనము లేవియును పనిచేయనిచో హృదయమునకుత్సాహము కలిగించుటకు, బ్రాండ్, విస్కీ మున్నగు సారాయాలను గాని బలమైన కాఫీనిగాని, టీని గాని యియ్యవలెను. తల క్రింద దిండ్లను తీసివేయ వలెను. కాళ్ల వైపున మంచపు కోళ్లక్రింద యిటు కలను పెట్టి కాళ్ల వైపున మంచమును కొంచెము పైకి లేపవలెను. రక్తము, లోపలి అవయవములలోనికి పోవుట అవసరము గాన, అటుల

పోవుటకుగాను కాళ్లకును, చేతులకును పట్టెదలను (బాండేజసు) కట్టవలెను. వీలైన ఎనిమాయియ్యవలెను. రెండు పైంటులు వెచ్చని నీళ్లలో రెండు నూనులు ఉప్పు కలిపి, పిల్లపేగుల (లోపరు బవెల్సు) లోనికి యెనిమా చేసి ఆ నీరు అచటనే యుండునట్లు చూడవలెను.

(౨) ఈడ్పులు.

ప్రసవము కాక ముందుగాని, ప్రసవ సమయమునగాని, ప్రసవమైన పిమ్మట గాని యీడ్పులు మున్నగునవి కలిగినచో వెంటనే వైద్యుని పిలువవలెను. అంత వరకును ఆ స్త్రీ ఈడ్పులలో దొరలి క్రిందపడకుండుటకు గాను క్రిందనే పరుండ బెట్టవలెను కాళ్లును చేతులను నేలపై వేసి కొట్టుకొని గాయములను తగిలించు కొనక చూచుచుండవలెను. ఆమె కట్టుకొనిన బట్టలన్నిటిని వదులు చేయవలెను. మంచి చల్లని గాలి తగులు చోట పరుండ బెట్టవలెను. ముఖము పైని చల్లని నీళ్లు చల్లవలెను. నాలుక కొరుకుకొన కుండుటకు పళ్ల సందున మడత బెట్టిన గుడ్డలైనను, మెత్తని కర్ర ముక్కనైనను కర్ర బిరడానైనను పెట్టవలెను. తల వేడిగా నున్నచో, చల్లని నీళ్లను గాని, మంచు గెడ్డను గాని తలపైని పెట్టవలెను. ఆమె మింగ గలిగి

యున్నచో విరేచన మగుటకు కొంచెము ఆముదమును త్రాగించవలెను. లేనా వెచ్చని నీళ్లతో యెనిమా చేయవలెను. చెమట పట్టుటకు వేడి వేడి పానీయమును త్రాగించవలెను. వేడి తగ్గకుండుటకు బ్లాంకెట్లను కప్ప వలెను.

(3) బొడ్డు నరము పడిపోవుట.

ప్రమాదము వలన బొడ్డు నరము (కార్డు) జారిపోయినచో అది వస్త్రీకతును, శిశువు శరీరమునకును మధ్య పడి నలిగి పోవును. అటుల జరిగినచో శిశువు చనిపోవును. కావున వెంటనే డాక్టరును పిలువ వలెను. లోపలి పొరలు (మెంబ్రేన్సు) పగలకుండ నున్నచో గర్భవతి క్షాకాళ్ల మీదను, మోచేతుల మీదను ఆనుకొని వంగి కూర్చుండవలెను. పొరలు పగిలిపోయినచో కెండు మూడు వ్రేళ్లను లోనికి పోనిచ్చి బొడ్డు నరమును పైకి త్రోయటకు ప్రయత్నింప వలెను. మరల నొప్పి వచ్చు వరకును దాని నచటనే యుంచవలెను.

(౪) గర్భాశయము పగులుట.

ఈ ప్రమాదము సాధారణముగా కలుగదు గాని, ఇది మిక్కిలి అసాధారణమైనది. గర్భాశయము పగిలినచో యీ దిగువ వివరింపబడిన

అక్షణములు కలుగును. ఆకస్మికముగా భరింపరాని బాధ కలుగును. ఏదో జారి పడిపోవుచున్నట్లు తోచును. ద్వారమున కనబడిన శిశువు మరల లోనికి పోవును. ఆ ద్వారమున పేగుల చుట్టలు కనబడును. రక్త మధికముగా పోవుచుండును, చలిగానుండును, చెమట పట్టును, నాడి బలహీనమగును. ఊపిరి త్వరగాను, కొద్దిగాను వెడలుచుండును. వెంటనే డాక్టరును పిలువవలెను. ఇది చాల అపాయకరమైనది గాన గర్భవతికి ప్రాణాపాయము కలుగకుండుటకు వేడి వేడి కాఫీ మున్నగు నుత్తేజకముల నిచ్చుచుండవలెను. ఒక గుడ్డను, పరిశుద్ధి నొందింపబడిన (స్టెరిలైజుడు) వెచ్చనినీళ్లలో మంచి దానిని పేగుల చుట్టలపైని కప్పవలెను.

గి. యోనిమార్గ ద్వారము (పెరినియం) పగులుట

శిశువు తల యీ మార్గద్వారముగుండ పోవుచున్నపు డీ ద్వారమును బాగుగా నొక్కి పట్టి యుంచినచో నిట్టి ప్రమాదము లెన్నడును కలుగవు. తొలికాన్ను నందెంత జాగ్రత్తగా నున్ననుగూడ చాలమందికి యీద్వారముకొద్దిగా పగులుచునే యుండును. అటులపగిలినచో డాక్టరు దానిని వెంటనే కుట్టివేయవలెను. డాక్టరు వచ్చువరకును ఆభాగమును (1-100) లిసలు ద్రావకముతో తడుపు చుండవలెను. లోనుండి వచ్చు

మరికి ద్రవములవలన నది మలినము కాకుండ దానిని కాపాడవలెను. గర్భవతిని పరుండబెట్టి గెండుకాళ్లను కలిపి కట్టివేయవలెను,

౬. గర్భాశయము వెలుపలికి వచ్చుట.

గర్భాశయము వెలుపలికి వచ్చినచో రక్తము స్రవించును, గట్టి పడిన మాంసపు ముద్ద ద్వారమున కనబడును. కడుపు దిగువ భాగమునందు ముద్దగాకనబడు చుండవలసిన గర్భాశయముయొక్క పైభాగమచట కనబడదు. గర్భాశయము పగిలి నపుడు కలుగురీతినే, చలియును, చెమటయును, కలుగును. ఇదికూడ చాలప్రమాదకరమే కావున, వెంటనే డాక్టరును పిలువవలెను. ఈలోగావేళ్లను ముడిచి రక్తముతోకూడ ద్వారమున కనబడుచున్న ముద్దను గట్టిగాలోనికి త్రోయవలెను. దానివలన నది లోనికి పోనిచో టీ, కాఫీమున్నగును త్రేజకములను త్రాగించుచుండవలెను. శిశువు, కలిగినపిమ్మట మావిత్వరగా పడిపోవుటకు గాను బొడ్డునరమును (కార్డు) లాగిన చుడలనే యీ కడపటి ఉపద్రవము సాధారణముగా కలుగుచుండును.



పదునొకండవ ప్రకరణము.

ప్రసవానంతరము పెద్ద పురుడులో కలుగు చిక్కులు.

౧. రక్త స్రావము:—శిశువు జనించిన పిమ్మట పదిరోజుల లోగా రక్తస్రావము కలిగినచో వెంటనే వైద్యుని పిలువనంప వలెను. అతడు వచ్చువరకును పదియవ ప్రకరణములో ప్రసవము నందు ఉద్భృతములను శీర్షిక క్రింద తెలుపబడిన సాధనములను చేయుచుండవలెను.

౨. పెద్దపురుడులో ప్రసూతిక జ్వరము:—ఇది చాల అపాయకరమైనది. శిశువు పుట్టినపిమ్మట కొందరికి యీ జ్వరము వచ్చుచుండును. ప్రసవమునకు ముందైనను, ప్రసవసమయము నందైనను, ప్రసవానంతరము నందైనను స్త్రీలకు రహస్యాంత రావయవ మార్గముల ద్వారా, మరికి లోన చేరుటవలననే యీ జ్వరము వచ్చును. ఈ జ్వరము వచ్చినచో ప్రసవమైన పిమ్మట త్వరలోనే వణుకుపుట్టును. వెంటనే జ్వరము తగులును, నాడి చాల వడిగా కొట్టుకొనును. స్తన్య మిగిలిపోవును. యోనిగుండ స్రవించుద్రవము పూర్తిగా నిలచిపోవును. లేదా తక్కువయగును. చాల మందికి ఆ త్రవమునకు చాల దుర్వాసన గూడ

కలుగును, కడుపు ఉబ్బి మెత్తబడును. కొందరికి వాంతులు, విదాహము, చెమట మున్నగునవి గూడ కలుగును. ఈలక్షణము లేవైన కలిగినచో యెంతమాత్రమును ఆలస్యము చేయకుండ వైద్యుని పిలిపింపవలెను. విరేచనము సరిగా కాక పోయినచో డాక్టరువచ్చులోగా ఎసిమానియ్య వలెను. లేదా ఆముదమును త్రాగించవలెను. కానిచో మెగ్నీషియం సల్ఫేటును గాని, సోడియం సల్ఫేటును గాని ఒక టేబిలుస్పూను యియ్యవలెను. రెండుపైంటులు వెచ్చని నీళ్ళలో రెండు టీ స్పూనులు లిసలు గ్రావకమును కలిపి యోనిలో పిచికార చేయవలెను. లిస్సిడు పిండిని వుడికించి వెచ్చగా కడుపుమీద వేయవలెను. గదిలోనికి గాలి బాగుగా వచ్చుచుండ వలెను.

3. తెల్లకాలు (వైటులెగు):—కొందరికి ఒకకాలును, కొందరికి రెండు కాళ్లును వాచును. నొప్పిగూడ కలుగును. తొడ అడుగుభాగము నుండి పొడము వరకునుగూడ వాపు కలుగును. ప్రసవమైన మొదటి వారము మొదలు, అయిదవ వారములోగా నిది వచ్చును. మొదట వణుకు, జ్వరము, గాహము, వికారము, నాడి తీవ్రమగుట, నాలుకపై పొది, నడుమునొప్పి మున్నగునవి కలుగును. రక్తనాళములలో రక్తము పేరు కొనుటయే దీనికి కారణము. వాచినభాగము చేతికి వేడిగాను,

మెత్తగాను, పాలిపోయియు యుండును. ఆభాగము నిగనిగలాడు చుండును. ఆ భాగమును కదలించుటకే వీలుండదు. ఆపుడు వైద్యునికి తెలియజేయవలెను. కదలనీయ గూడదు. ఆ భాగముపైని దూచితోను, ప్లానలతోను కట్టు (బాండేజి) కట్టవలెను. వేడినీళ్లతో తరుచుగా కాచుచుండవలెను. అవసరమైనచో కొద్దిగా విరేచన సాధనముగూడ చేయవలెను.

మరా:—అపుడు బాలింతరాలి కాళ్లను ముట్టుకొనగూడదు. ముట్టుకొనినను, పట్టినను, నలిపినను ఆ రక్తపుగడ్డ పగులును. అందువలన బాలింతరాలికి ప్రాణాపాయము గూడ కలుగవచ్చును.

౪. పెద్దపురుడులో పిచ్చియెత్తుట:—శిశువు జనించిన వెంటనే కొందరికిని, శిశువుకు పాలిచ్చుట మానినపుడు కొందరికిని, పిచ్చియెత్తుట కూడ కలదు. శిశువుకు అతివిస్తారముగా పాలిచ్చుట (ఓవరు నర్సింగు) వలననే ముఖ్యముగా నిటుల పిచ్చిపట్టును. మొదట కొందరికి కొద్దిగా జ్వరమువచ్చును. కొందరికి యీడ్చులు వచ్చును, కొందరికి నూతికా జ్వరమువచ్చును. పిమ్మట బాలింతరాండ్రకు నవ్వుట, పొడుట, అగభ్యముగ మాటలాడుట మున్నగు లక్షణములుగూడ కలుగవచ్చును. కొందరు

తమశిశువులను చంపుటకు గూడ ప్రయత్నించెదరు. అపుడు వెంటనే వైద్యుని పిలువవలెను. ఈ లక్షణములు కనబడగానే శిశువును తల్లి ప్రక్కలో నుండి తీసివేసి వేరొక చోటనుంచి పోతపాలుపోసి పెంచవలెను.

పన్నెండవ ప్రకరణము.

శిశు సంరక్షణము.

శిశువు పుట్టగానే శిశువునోటిలో జిగట, నరుగు మున్నగున వేవైన నున్నచో వానిని తీసివేయవలెను. పిమ్మట శిశువు యెడ్చినచో (శిశువు సజీవమై పుట్టినయడల అనగా కడుపులోనే చనిపోయి పుట్టనియడల విధిగా యేడ్చును) నాభినాళమును ముడివేసి కోసివేయవలెను. ఆ నాళమునకుగట్టిగా రెండు చోట్ల కట్టుకట్టవలెను. శిశువునాభిపైని 2 $\frac{1}{2}$ అంగుళముల దూరమున ఒక కట్టును, 3 అంగుళములకు పైగా రెండవ కట్టును కట్టవలెను. ఈ రెండు కట్టుకును మధ్యగా మొద్దుబారిన కత్తెరతో కత్తిరించవలెను. శిశువు పుట్టమన్నపుడు శిశువును పట్టుకొనుటకు ఒక వెచ్చని దుప్పటి (బ్లాంకెటు) గాని, ప్లానలు గుడ్డ గాని సిద్ధముగా నుండవలెను. లేనిచో శిశువు క్రింద పడినయడల దెబ్బ తగులును. శిశువు జనించినపుడు శిశువు మెడ వెనుక భాగము ఒక చేతి బొట్టన వ్రేలికిని రెండవ వ్రేలికిని మధ్యగా నుండునట్లు పట్టుకొనవలెను. శిశువు తొడలను రెండవ చేతితో పట్టుకొనవలెను. బోరికు

యాసిడులో వేసి దూదిని నీళ్లలో ముంచి దానితో శిశువు కనులను జాగ్రత్తగా కడుగవలెను.

97 డిగ్రీల ఎఫ్ ఉష్ణము గల వేడి నీళ్లను సిద్ధపరిచి శిశువు శరీరము నా నీళ్లలో ముంచవలెను. థెర్మామిటరు లేనిచో మోచేతినా నీళ్లలో ముంచుటవలన నీళ్లు సరియైన పాళములో నున్నదియు లేనిదియు బాగుగా తెలియును. అటుల ముంచి శిశువు వంటి నంటుకొనియున్న జిడ్డునంతను శుభ్రము చేయవలెను. చంకలు, గజ్జలు, కనుబొమలు మున్నగు స్థలములలో జిడ్డు పట్టుకొనియుండును. వినోలియూగ్లిస్సరైను మున్నగు మెత్తని నబ్బులతో రుద్ది తువాలుతో గాని, స్పంజితో గాని శిశువు వల్లు తుడువవలెను. ఇది చాల శుభ్రముగాను, మెత్తగాను యుండవలెను. మూడు నాలుగు నిమిషములకంటె హెచ్చుగా శిశువును నీళ్లలో నుంచగూడదు. జిడ్డు పూర్తిగా వదలక పోయిననుగూడ తీసి వేయవలెను. జిడ్డు యేమైన మిగిలియున్నచో తరువాత చేయించు స్నానములలో పూర్తిగా వదలిపోవును. తొట్టిలో స్నానము చేయించు నపుడు తొట్టిలో నీళ్లు కొద్దిగా పోసి శిశువును తొట్టిలోనే తల నీటిపై కుండునట్లు పరుండ బెట్టవలెను. గాని ఒక చేతితో పట్టుకొని యుంచగూడదు. ఏల ననగా శిశువుల యెముకలు చాల మెత్తగానుం

డును గాన శరీరము యొక్క బరువును సహింప జాలవు. ఈ రీతిగా స్నానము చేయించిన పిమ్మట తేలికగా తుడిచి శిశువు నొక మెత్తని టెక్సా (పిల్లో) పైని పరుండబెట్టి పలచని స్థానము గుడ్డను కప్పవలెను.

నాభి నాళము:—తరువాత నాభి నాళమునకు చికిత్స చేయవలెను. నాళమునకు కట్టబడిన కట్టును ముడివద్ద కోసి వేయవలెను. ముడి తొలిగినదా, సరిగా నున్నదా, రక్తము స్రవించుచున్నదా, అని పరీక్షించి, ముడి తొలిగినను, రక్తము స్రవించుచున్నను మరియొక కట్టు కట్టవలెను. నాళము నటుల కోసిన పిమ్మట ఆ కొనపైని బోరికు యాసిడును చల్లి బోరికు దూది ముక్కను దాని పైనివేసి కట్టుకట్టవలెను. ఈ కట్టు బిగువుగా నుండగూడదు. ఈ రీతిగా 5, 6 రోజుల వరకును ప్రతిదినమును నాళమునకు చికిత్స చేయుచుండవలెను. అప్పుడే నాళము వూడిపోవును. దాని దిగువను చిన్న గాయము మాత్రముండును. అది త్వరగానే మానిపోవును. నాళ మటుల త్వరగా విడిపోకున్నను తొందరపడి దానిని లాగ గూడదు. క్రమముగా అదియే ఊిపోవును.

క్రొత్తగా పుట్టిన శిశువుకు మందు:—శిశువు పుట్టిన వెంటనే యేదో యొకమందు వేయవలెనని చాలమంది అభిప్రాయ పడుచున్నా

రు. క్రొత్తగా పుట్టిన శిశువుకు మందు యెంత మాత్రమును అవసరము లేదు గాన, నిది చాల పొరబాటు అభిప్రాయము. ఆ శిశువుకు మందు వేయుట వలన మరింత హానియే కలుగును గాని మేలుకలుగదు. శిశువు పుట్టిన వెంటనే కొంతసేపు నిద్రపోవుట సహజము. శిశువు కనులకు నెలుతురు తగులకుండ యేర్పాటు చేయవలెను. శిశువు శరీరమునకు చలిగాలి తగులగూడదు. శిశువు తనంతట లేచి యేడ్చువరకును లేప గూడదు. శిశువుకు పాలు పోయనిచో శోషవచ్చునను దురభిప్రాయ మున కొందరు శిశువుకు నిద్రాభంగము కలిగించెదరు. 5, 6 గంటల సేపు నిద్రపోయిన పిమ్మట శిశువుకు మెలకువ వచ్చును. అప్పుడు శిశువు యేడ్చును. అప్పుడు శిశువుకు స్తన్యము నియ్యవలెను. అప్పుడు బాలింత రాలు రొమ్మును శిశువునోట పెట్టవలెను. అందు వలన ఆమెకు పాలు ఊరును. గర్భాశయము ముడుచుకొనును. మొదట బాలింతరాలి రొమ్ము లలోనుండి వచ్చు ధారలలో శిశువుకు విరేచనమును కలిగించు శక్తిని ప్రకృతి నెల కొలిపి యున్నది. కావున శిశువులకు ఆముదము మున్నగు వాని నియ్యకుండ యీ పాల ధారలను ముఖ్యముగా త్రాగ నియ్య వలెను. ఆ రీతిగా తొలి ధారలు శిశువుకు లభించుట కవకాశము కలుగ నపుడును, నెలలు పూర్తి గాకుండ ప్రసవ మగుట వలన తల్లికి పాలు

ఉజినపుడును, ఈ తొలిధారల వలన శిశువుకు విరేచనము కానపుడును మాత్రమే ఒక టీ స్పూను ఆముదమును శిశువుకు త్రాగింపవచ్చును. శిశువు పుట్టిన పిమ్మట కొన్ని గంటలగు సరికి మొదటి విరేచనముగను. అది పసుపు రంగుగా నుండును. దానిని మెకోనియం అందురు. సాధా రణముగా శిశువులు తొలిసారి మాత్రము వదలునపుడే విరేచనముగూడ నగును. తొలిధారలను త్రాగుట వలననే చాలమంది శిశువులకి మెకో నియం వెడలిపోవును. ఇది శిశువు కడుపులో నిలువయుండినచో అజీర్తి విరేచనములు కలుగును. గాన దీని నెటులైన వెడలింపవలెను. మూడవ మాటు విరేచనము పసుపు రంగుగా నుండక నల్లగా నున్నచో ఒకటి స్పూను ఆముదమును త్రాగింపదగును.

క్రొత్తగా పుట్టిన శిశువులకు ఆహారము:—శిశువు పుట్టిన వెంట నే పాలిచ్చు ఆచారము మంచిది గాదు. పుట్టిన పిమ్మట 10, 12 గంటల వరకును శిశువెట్టి ఆహారమును కోరదు. శిశువుకు తల్లి చనుపాలే చాలును. మలిచాలు మొదలు బాలింతలకు ప్రసవమైన వెంటనే గూడ బాగుగా పాలూరును. గాన శిశువు పుట్టిన 12 గంటలలోనే వారు పాలియ్య గలుగుదురు. అటుల తల్లికి శిశువు కలిగిన వెంటనే పాలు ఉజనిచో అనగా పాలు ఉక్కిగుట కొంత ఆలస్యమైనచో అవు

పాలను, నీళ్లను, తియ్యగానుండుటకు కొద్దిగా చక్కెరను కలిపి మూడు గంటల కొకసారి శిశువుకు పోయించుండవలెను. తల్లికి పాలు ఉరినది మొదలు శిశువు తల్లిపాలనే త్రాగుచుండవలెను. శిశువుకు తల్లిపాలిచ్చినపుడు, రొమ్మును వేళ్లతో నొక్కి పట్టుకొని చనుమొనను శిశువు నోట పెట్టవలెను. మొదటి పదిరోజులలోను శిశువు నిద్ర లేచినపుడు మాత్రమే పాలిచ్చుచుండవలెను. అటుపిమ్మట 20 రోజుల వరకును పగటిపూట కెండు గంటల కొకసారియును, రాత్రి మూడు గంటల కొకసారియును పాలిచ్చుచుండవలెను. నెల రోజులైన పిమ్మట క్రమముగా నాలుగు గంటల కొకసారి పాలిచ్చు పద్ధతి నవలంబింపవలెను. రాత్రి 10 గంటల మొదలు ఉదయము 5 గంటల వరకును పాలియ్యగూడదు. క్రమముగా యీ పద్ధతిని గూడ అవలంబింపదగును. అందువలన తల్లికి నిద్రాభంగము కలుగకుండ నుండును. శిశువు ఏడ్చినపుడెల్ల ఆకలియగుట వలననే యేడ్చుచున్నదని తలపగూడదు. దాహము వేయుట వలనగూడ శిశువు లేడ్చెదరు. నీళ్లను మరిగించి చల్లార బోసి, ఒక టీ స్పూను నీళ్లు శిశువుకు పోసినచో శిశువు యేడ్చు మానును, శిశువుకు ఒకసారి ఒక రొమ్ము నోట బెట్టినచో మరియొక సారి వేరొక రొమ్మును నోట బెట్టవలెను. ఈ రీతిగా రొమ్ములను మార్చి మార్చి పాలిచ్చు చుండవలెను.

బట్టలు:—శిశువుల బట్టలు తేలికగాను, వదులుగాను వెచ్చగాను యుండవలెను.

వెచ్చదనము:—శిశువుకు వెచ్చదనము కలుగుటకు శిశువును మొదట తల్లి ప్రక్కలోనే పరుండ బెట్టవలెను. కాని దిండ్లను విస్తారముగా పెట్టగూడదు. మూడు వారములైన పిమ్మట శిశువును వేరొక ప్రక్కమీదనే పరుండ బెట్టవలెను.




పదుమూడవ ప్రకరణము.

శిశువులు పుట్టినపిమ్మట నారికి కలుగునట్టి వ్యాధులు

శిశువు పుట్టినపిమ్మట తలి దండ్రులకు ఆందోళనమును కలిగించు నట్టి పరిస్థితుల నేకము కలుగుట కవకాశము కలదు.

(౧) మృత శిశువు పుట్టుట:—శిశువు పుట్టినపుడు కదలిక లేకుండను, యేడ్వకుండను ప్రాణహితమగు శిశువువలె కనబడినచో వెంటనే డాక్టరును పిలువవలెను. శుభ్రమైన గుడ్డను వేలికిచుట్టుకొని ఆ వేలిని శిశువు నోటిలోనికి పోనిచ్చి గొంతుకలో ద్రవముగాని, జగటుగాని అడ్డుపడియున్నచో దానిని తీసివేయవలెను. నాభీనాళమునకు బొడ్డుకు వైభాగమున మూడంగుళముల దూరమున నొకకట్టు గట్టిగా కట్టవలెను. క్రిందిభాగమున ఒకటి రెండంగుళముల దూరములో మరొక కట్టుకట్టవలెను. గాని వైదానిని బిగించినట్లు క్రిందిదానిని గట్టిగా బిగించ గూడదు. ఈ రెండు కట్టుకుమధ్య భాగమున నాళమును విభజించవలెను. ఒక టీ నూపున రక్తము వెలికివచ్చు వరకును క్రింది భాగమునందలి కట్టును బిగించగూడదు. ఇటుల చేయగానే అదివరకు ఏవ ప్రాయములుగా నున్న శిశువులకు కొందరికి ఊపిరాడును, వారు

యేడ్చుటగూడ జరుగును. ఇటులచేసినను శిశువుయేడువరకున్నచో చన్నిళ్లను వేడినీళ్లను మార్చిమార్చి శిశువు మైని చిలకరించు చుండవలెను. దీని వలనగూడ లాభము కలుగనిచో నోటిని శుభ్రపరచిన పిమ్మట తడిగుడ్డను




(మార్వలుహాలుగారి పద్ధతి ప్రకారము కృత్రిమ సాధనములవలన ఊపిరాడునట్లు చేయుట)

మడిచి దాని కోణములో మొగము మీదను, తుంట్లమీదను కొట్టవలెను. ఒక పక్షి యీకెను ముక్కులలోను నోటిలోను పెట్టి త్రిప్పవలెను. ఇవన్నియునుగూడ విఫలమైనచో డాక్టరు వచ్చి ఊపిరిని కలిగించుటకు స్వయముగా ప్రయత్నించి చూడవలెను. అతడటుల చేయుచుండగా శిశువుకు స్నానము చేయించుటకు వేడి నీళ్లను సిద్ధ

పరుచవలెను. బొడ్డునాళమును కోసి కట్టుకట్టిన పిమ్మట శిశువును వేడినీళ్లలో పరుండబెట్ట వలెను. కొందరు శిశువులు పుట్టిన పిమ్మట రెండుగంటల వరకును గూడ మృతప్రాయముగా నుండుటయు అవల ఊపిరి వచ్చి యేడ్చుటయును గూడ జరుగుచుండును.

(2) కళ్లంటుకొనుట:—శిశువు నిద్రపోయి లేచినపుడు కను రెప్పలంటుకొని పోవును, కనుకొలుకులు యేరబడును, వెలుతురులో



మాన్వలుహాలుగారి పద్ధతిప్రకారము కృత్రిమ సాధనములవలన ఊపి రాడునట్లు చేయుట (ఇనిస్పిరేషను).

వును చాల పరిశుభ్రముగా నుంచవలెను. బోరికు దూదిని వేడి నీళ్లలో ముంచి దానితో తరుచుగా కనులను కడుగుచుండ వలెను. కను రెప్పలంటుకొనకుండ వాసలైనను రెప్పలకు రాయుచుండ వలెను శిశువుల కండ్లజబ్బుల కిదియే చికిత్స.

కనులు మూతపడును, కను రెప్పలు వాచును, కనులలో నుండి నీరు కారును. అపరి శుభ్రత వలనను, తల్లి గుహ్యేంద్రియముల నుండి వెడలునట్టి మురికి నీరు శిశువు కనులకు సోకుట వలనను, పుట్టిన వెంటనేతొలిసారి నీళ్లుపోయు నపుడు సబ్బుతో రుద్దుటలో సబ్బునీళ్లు శిశువు కనులలోనికి పోవుటవలనను గూడ నిట్టి కంటి జబ్బులు కలుగును. శిశు

(3) మూత్రము వెడలక పోవుట:—కొందరు శిశువులు పుట్టిన పిమ్మట 24 గంటల వరకునుగూడ మూత్రమును వదలరు. అట్టి శిశువులు కాళ్లను ముడుచుకొని బాధవలన యేడ్చు చుందురు. అట్టిచో వెంటనే డాక్టరును పిలువనంప వలెను. శిశువుకు వెచ్చని నీళ్లుపోసి స్నానము చేయించవలెను. లేదా పేగుల క్రిందిభాగమున కాచవలెను. అటుల చేసినచో మూత్రము వెడలును.

(4) పచ్చ కామెరలు:—ఈ వ్యాధి వచ్చినచో శిశువు శుభ్ర పనుపు రంగుగానుండును. కంటిలోని తెల్లగుడ్డుకు గూడ పసుపురంగు కలుగును. మూత్రము నల్లగానుండును. గాని మూత్రము బట్టమీద పడినచో నచట పసుపు రంగమర కలుగును. విరేచనము తెల్లగానగును. కాలేయము (లివరు) సరిగా పనిచేయక పోవుటయే దీనికిముఖ్యకారణము. డాక్టరును పిలువనంప వలెనుగాని వెంటనే ఒక టీ నూనెను ఆముదమును శిశువుకు పెట్టవలెను.

(5) బొడ్డులో పుండగుట:—కొంతమంది శిశువులకు బొడ్డు లో పుండగును. ఆ బాధవలన యీడ్పులు గూడ వచ్చును. ఆ పుండు మీద బోరికు యాసిడును వేసి దానిపైని బోరికు దూదిని వుంచి కట్టు కట్టవలెను.

(౬) ఈడ్పులు:—ఈడ్పు వచ్చినపుడు కనులకును, మొగమునకును సంబంధించిన కండరములు ముడిబడును, శరీరము బిర్ర బిగియును, చేతులు బిగుసుకొని పోవును, నోటిలోనుండి కొద్దిగా చొంగవచ్చును, మొగమునకు నీలి రంగు (బ్లూ) వచ్చును. వూపిరినిలచి పోవును. వెంటనే డాక్టరును పిలువనంప వలెనుగాని, శిశువును తక్షణమే వెచ్చని నీళ్లతోబాటు పరుండబెట్టి దానిలో అయిదు నిమిషములుంచ వలెను. శిశువుతలకు చలవచేయు వస్తువులను కట్టవలెను.



పదునాల్గవ ప్రకరణము.

శిశువుల కాహారము.

శిశువులను పోషించుట యందును, శిశువుల కాహారము నిచ్చుట యందును అతిసులభములగు ఆరోగ్య నియమములను నైతము తలిదండ్రులు సరిగా తెలుసుకొనక పోవుటవలననే శిశువులలో చాలమంది ముఖ్యముగా యేడాది లోపుననే చనిపోవు చున్నారు. అందుకొరకు కొన్నినూచన లిచట చేయబడినవి. బిడ్డల తల్లులు వీనిని గమనింప దగును.

శిశువుల కాహారము నిచ్చుటలో రెండు విధములున్నవి:—

1. శిశువునకు తల్లి చనుగుడుపుట. 2. పోతపాలను పోయుట.
- క్రొత్తగా పుట్టిన శిశువు జీర్ణకోశమునకు తల్లిస్తన్యమును జీర్ణముచేసుకొన గలశక్తి మాత్రమే యుండునుగాన శిశువుకు తల్లిచను బాటే మిక్కిలి శ్రేష్ఠమైనది. పోతపాలు త్రాగిన బిడ్డలకు సోకునంత హెచ్చుగాన తీవ్రముగను వ్యాధులు చనుబాలు త్రాగిన బిడ్డలకు సోకవు. కావున సాధ్యమగు సంతవరకు తనశిశువుకు తల్లియే చనుగుడుప వలెను.

తల్లికి జబ్బుచేసినను తేక తల్లి చనిపోయినను యొకపాల దాయాని నియమింపవలెను. పాలదాయి సంపూర్ణారోగ్య వతిగాను, బలముగలదిగాను యుండవలెను గాని చాలలావు పారినదిగా నుండ గూడదు. ఆమెకు త్వయ, సహాయమున్నగు నంటువ్యాధులేవియు నుండ గూడదు. ఆమెకు 20-30యేండ్ల మధ్యవయసుండవలెను. ఆమె శిశువును యీ శిశువును సమ వయస్కులుగా నుండవలెను. ఆమె కోపస్వ భావము కలదిగా నుండగూడదు. శాంత స్వభావముకలదిగా నుండవలెను. ఆమెకు తరుచుగా కోపమువచ్చు చుండునెడల, ఆమె పాలను త్రాగుట వలన శిశువుకుకడుపునొప్పి అజీర్తి ఈడ్పులు మున్నగు వ్యాధులేగాక ప్రబల వ్యాధులు గూడ కలుగవచ్చును. గాన నట్టి స్త్రీలచే శిశువులకు పాలిప్పించ గూడదు.

శిశువు జనించిన పిమ్మట రెండుగంటలు మొదలు నాలుగు గంటలలోగా తల్లి శిశువుకు చనుగుడుపవలెను. మొదట పంచదార నీళ్లను చనుముక్కులకు రాయవలెను. శిశువు జనించిన పిమ్మట రెండురోజుల వరకును అన్నము, గంజి, జావ, మున్నగున జీర్ణకరములగు నాహారములను వేనిని పెట్టగూడదు. అదిచాల అపాయకరము ఒకరోజుకు 24 గంటలలోను 4 మొదలు 6 సార్లువరకును శిశువుకు

తల్లి చనుగుడుపు చుండవచ్చును. పగటిపూట. మొదటి అయిదువార ములును తప్పక రెండు గంటల కొకసారి తల్లి చనుగుడుప వలెను. ఆరవవారము మొదలు 12 వ వారము వరకును $2\frac{1}{2}$ గంటల కొకసారి స్తన్యము నియ్యవలెను. మూడవ నెల మొదలు తొమ్మిదవ నెల వరకును మూడు గంటలకొకసారి స్తన్యము నియ్యవలెను. తొమ్మిదవ నెల మొదలు పన్నెండవ నెలవరకును $3\frac{1}{2}$ గంటల కొకసారి పాలిచ్చు చుండవలెను. రాత్రిపూట మొదటి వారమున ఒకటి రెండు సార్లు మాత్రమే పాలియ్యవలెను. అటుపిమ్మట అయిదవనెల వరకును రాత్రి 10 గంటలపు డొక్కసారి మాత్రమే పాలియ్య వలెను. అయిదవ నెల వచ్చినపిమ్మట రాత్రి 10 గంటలు మొదలు ఉదయము 6 గంటల వరకును శిశువుకు పాలియ్యనే గూడదు.

ఈరీతిగా వేళ ప్రకారము శిశువులకు పాలిచ్చుట చాల ముఖ్యమైనది. శిశువు యేడ్చినపు డెల్ల పాలియ్యగూడదు. అందువలన అజీర్ణము, కడుపునొప్పి, విరేచనములు మున్నగునవి కలుగును. వేళ ప్రకారము పాలిచ్చు చున్నపుడు మధ్య శిశువు యేడ్చినచో శిశువునకు దాహమైనదని గ్రహింపవలెను. అప్పుడు వెచ్చని నీళ్లను కొద్దిగా త్రాగి

చినచో శిశువు పరుండును. ఎప్పుడును గూడ తడవకు 15 నిమిషముల కంటే హెచ్చుగా పాలియ్యగూడదు.

తల్లి పాలియ్య లేనపుడును, పాలిచ్చుటకు మరే స్త్రీయును లభింపనపుడును యితర జంతువుల పాలనే శిశువులకు పోయవలెను. ఏ జంతువు పాలును మనుష్య స్త్రీ పాలవలె నుండవు. జంతువుల పాలలో ఆవు పాలే సులభముగా లభించును. ఆవు పాలను అటులే శిశువులకు పోసినచో వారికవి జీర్ణమునకు రావు. మనుష్య స్త్రీ పాల లోను, ఆవు పాలలోను వస్తు సంపుటిలో భేదమున్నది. రెండిటిలోను కొవ్వు సమానముగానే యుండును. గాని ఆవు పాలలో మాంసకృత్తులు హెచ్చుగాను (100-కి $31\frac{1}{2}$) చక్కెర తక్కువగాను (100-కి $41\frac{1}{2}$) యుండును. కడుపులోనికి పోయినపిమ్మట స్త్రీలపాలు ఔరముగాను, ఆవు పాలు పసరుగాను పరిణమించును. స్త్రీల పాలయందలి మాంస కృత్తుల యందుండు జున్ను (కేసిన) కంటే ఆవుపాలలోని మాంస కృత్తులయందు జున్ను హెచ్చుగానుండును. అందువలన మనుష్య స్త్రీల పాలు త్రాగుటవలన, కడుపులో నవి పేరుకొనినను చాల పలచగాను, చిన్న చిన్న బిళ్లలుగాను పేరుకొనును. ఆవుపాలు చాల దళము గాను పెద్దపెద్ద బిళ్లలుగాను పేరుకొనును. గాన స్త్రీలపాలు అరుగు

నంత సీఘ్రముగ ఆవుపాలు అరుగవు. కావున ఆవు పాలలో మంచి నీళ్లనుగాని, బాక్టీరియ్యపు నీళ్లను గాని సమభాగములుగా (అళాకు పాలకు అళాకు నీళ్ళు) చేర్చి శిశువులకు పోయవలెను. అటుల పోసినచో మాంసకృత్తులు $31\frac{1}{2}$ నుండి $11\frac{1}{2}$ కు తగ్గును. ఆవుడు ఆవు పాలును స్త్రీల పాల వలెనేయుండును. ఇటుల పాలలో నీరు కలుపుట వలన మాంసకృత్తులు తగ్గును గాని వానితోపాటు యితర ద్రవ్యము లన్నియును గూడ తగ్గును. కొవ్వుతగ్గిపోవును గాన మిగడను చేర్చి వలెను. మిగడలో 100-కి 16-20 పాళ్ళు కొవ్వుండును. చక్కెర తగ్గిపోవును గాన, పాలచక్కెర (మిల్క్-షుగరు) ను చేర్చవలెను. పాలచక్కెరపాలలో సహజమైనది. చెరుకుచక్కెర, యితర చక్కెరలు మున్నగు వానికంటే పాల చక్కెరయే శిశువులకు బాగుగా సరిపడును. ఆవు పాలు పసరుగా మారకుండ ఔరముగా మారుటకు సున్నపు నీళ్ల (లైమువాటరు) ను గాని సోడా లై కాల్సోనేటును గాని చేర్చవలెను.

శిశువు జనించిన పిమ్మట 15 రోజుల వరకును పాలను నీళ్లను కలుపుటలో 1-3 గా, అనగా ఒక అళాకు పాలకు మూడు అళాకులు నీళ్ల వంతునను, అటుపిమ్మట మూడవ నెల వచ్చువరకును 1-2 వంతు


నను, మూడవ నెల మొదలు ఆరవ నెల వరకును 1-1 వంతునను 6 వ నెల మొదలు 9వ నెల వరకును, 2-1వంతునను మిశ్రమము చేయుచుండవలెను. మొదటి నెలలో ఒక తడవకు 1-1½ అవున్నుల పాలును, రెండవ నెల లో 2-3 అవున్నులును, మూడవ నెలలో 3-4 అవున్నులును, నాల్గయిదు నెలలలో 4-5 అవున్నులును, ఆరవ నెలలో 5, 6 అవున్నులును, ఏడవ నెల మొదలు తొమ్మిదవ నెల వరకును 6-7 అవున్నులును, తొమ్మిదవ నెల మొదలు పన్నెండవ నెల వరకును 8-9 అవున్నులును పోయుచుండవలెను. మరిగించని పాలను అనగా పచ్చిపాలను త్రాగించిననే శిశువుల కధికమగు పుష్టి కలుగును గాని చెన్నపురిపాలను మరిగించకుండ యెన్నడును పోయగూడదు. ఏల ననగా వానిలో క్రిములుండును. అందువలన అజీర్ణ సంబంధములగు వ్యాధులు కలుగును.

ఇప్పుడు అనేక విధములగు డబ్బాపాలు విక్రయింప బడుచున్నవి. ఇవి స్త్రీల పాలకంటెను గూడ శ్రేష్ఠమనివారు చెప్ప కున్నను స్త్రీల పాలతో సమానమగు గుణముగల వని మాత్రము ఘంటాపథముగా ఘోషించుచున్నారు. ఈ డబ్బా పాలలో యేవి మంచివని నిర్ణయించుటలో మన మీ విషయములను గమనింపవలెను. తొమ్మిది నెలలలోపు శిశువులకు గంజి గల ఆహారములను వేనిని గూడ నియ్య

గూడదు. కావున గంజి పదార్థములన్నియును పూర్తిగా కొవ్వు పదార్థములుగా మారినట్టి డబ్బాపాలనే ఆరు నెలల లోపు శిశువులకు పోయవలెను. హార్లిక్స్ మాత్రైడు మిల్కును, ఎల్లను బరీఫుడ్ను 1,2 వం బరులును, మెలిన్సు ఫుడును శ్రేష్ఠమైనవి గాన వీనినే యిట్టి శిశువులకు పోయదగును.

పాలబుడ్లను రబ్బరు మొనలను గూడ చాల శుభ్రముగా నుంచవలెను. పాలబుడ్లు సరిగా నుండక పోయినను, రబ్బరు మొనలు మరికి

గా నుండినను పాలను సరిగా కాచక పోయిననుగూడ శిశువులకు చాల జబ్బు చేయును. బుడ్డి పడవ ఆకారముగా నుండవలెను. కోణములు, గుంటలు, వంకరలు మున్నగునవి యుండ గూడ




దు. బుడ్డిని కొళాయి క్రింద నుంచి బాగుగా కడుగుటకు వీలుగా నుండవలెను. శిశువు బుడ్డితోని పాల నన్నిటిని త్రాగిన వెంటనే బుడ్డిని తీసివేసి అడుగున మిగిలిన పాలను పారబోసి దానిలో నీళ్లు

పోషి బాగుగా గులకరించి కడిగి దానిని సోడా ద్రావకములో ముంచ వలెను. నీళ్లలో వాషింగు సోడా గుండను హెచ్చుగా కలిపి దానిలో యీ బుడ్డిని ముంచి యుంచవలెను.

ఇటుల శిశువు పాలు త్రాగిన వెంటనే రబ్బరు మొసలను గూడ లోపలను, వెలుపలను శుభ్రమైన నీటిలో బాగుగా కడుగవలెను. రబ్బరు మొసలకు పాలు తగిలినచో పాలులోని కొవ్వు రబ్బరును తిని వేయును గాన మొసలు త్వరగా పగిలిపోవును. చన్నీళ్లలో ఒక చిటి కెడు సోడా ద్రావకార్పొనేటును కలిపి యీ మొసల నా నీళ్లలో ముంచి

యుంచుట మిక్కిలి మంచిది.

పాల బుడ్డిని తల క్రిందుగా వంచినచో బుడ్డిలోని పాలు సులభముగా బొట్టు బొట్టుగా కారుచుండవలెను గాన రబ్బరు



మొసరంధ్ర మందుకుతగినంత పెద్దదిగా నుండవలెను. ఆ రంధ్రము మిక్కిలి పెద్దదిగాను యుండగూడదు, మిక్కిలి చిన్నదిగాను యుండగూడదు. మిక్కిలి పెద్దదైనచో పాలు చాల హెచ్చుగా స్రవించును. మిక్కిలి చిన్నదిగా నున్నచో పాలు సులభముగా రావు. పాలు పోసిన వెంటనే

రబ్బరు మొసను సీసా నుండి పూడ దీసి బాగుగా రుద్ది కడుగవలెను. పిమ్మట ఒక పైంటునీటిలో ఒక అవున్సు బోరకు యాసిడువేసి ఆ నీళ్లలో ఆ మొసలను ముంచి యుంచవలెను. వట్టి మొసను శిశువు నోట పెట్టు గూడదు. అటుల పెట్టినచో శిశువు చప్పరించుచుండును. అందువలన శిశువు కడుపులోనికి గాలి ప్రవేశించును. దానివలన కడుపు నొప్పి కలుగును.



ఈ గ్రంథకర్తచే వ్రాయబడిన యితర గ్రంథములు.

అంగ్ల, ద్రవిడ, ఆంధ్ర భాషలలో ఆరోగ్యోపన్యాస గ్రంథముల.

1. ఇండ్లు-ఆరోగ్యము	0	2	0
2. డాక్టరు వచ్చులోపల యేమి చేయవలెను	0	2	0
3. పాఠశాలలో ఆరోగ్య శాస్త్రము (హైజిన్)	0	4	0
4. జలము-ఆరోగ్యము	0	2	0
5. గాలి-ఆరోగ్యము	0	2	0
6. వ్యాధులు-ఆరోగ్యము	0	2	0
7. నిరోధింప బడదగిన వ్యాధులు	0	2	0
8. క్రిములను వ్యాపింపజేయు సామాన్య వ్యాధులు	0	2	0
9. పాలు-ఆరోగ్యము	0	2	0
10. బ్రాంచి సారాయిని (అల్కహాల్) త్రాగుట వలన కలుగు అపాయము	0	2	0
11. శారీరక ఆరోగ్య శాస్త్రము	0	4	0
12. ఇంటిలో ఉపచర్య	0	8	0
13. ఆహారము-ఆరోగ్యము	0	2	0

ప్రమాదములలో ప్రథమచికిత్స-ఆంధ్ర, ద్రవిడ, } 0 12 0
 పుస్తకములలో, ఆంగ్ల భాషలలో

శ్రీ కృష్ణ బిర్రుస్, పోస్టు బాక్సు 166, మదరాసు.

END OF
TITLE